


Intervet

*marca la
diferencia*

Cuidado de **la vaca** pre y posparto



**y su impacto
en la reproducción**



L I N E A G A N A D E R A

*es detectar cualquier problema de salud precozmente
de leche, mejor comportamiento reproductivo y l*

PROGRAMA DE MANEJO DEL **PREPARTO**

OBJETIVOS

- Eliminar las infecciones subclínicas presentes al momento del secado y prevenir nuevas infecciones durante el período seco.
- Secar a las vacas con una buena condición corporal y evitar cambios de esta durante el período seco.
- Vigilar la salud de las pezuñas.
- Suministrar a las vacas una dieta adecuada y un medio ambiente lo más confortable posible libre de estrés.

ACCIONES

- Tratar todos los cuartos de todas las vacas al secado con un tratamiento adecuado (que actúe contra los microorganismos presentes y que **proteja los 60 días**).
Usar **CEFA-SAFE / NAFPENZAL DC**®
- Implementar un programa de recorte de pezuñas y dar tratamiento con **COBACTAN**® según sea necesario.
- Manejar raciones y corrales de transición confortables donde se asegure una adecuada alimentación.

El objetivo en el **POSPARTO TEMPRANO**

ya que de esto dependerá tener mayor producción
supervivencia de **la vaca** en el establo.

PROGRAMA DE MANEJO DEL **POSPARTO**

OBJETIVOS

- Prevenir y controlar oportunamente las infecciones posparto.
- Implementar un programa de tratamientos hormonales profilácticos.
- Identificar y controlar los casos de mastitis.
- Evitar la excesiva pérdida de la condición corporal en los primeros 60 días en leche.

La mayoría de las vacas estuvieron afectadas con dos o más desordenes. Estos problemas incrementaron el riesgo de desecho y muerte de dos a cinco veces



POSPARTO

ACCIONES

- Las vacas deberan parir en el lugar más limpio de la explotación.

Proporcione asistencia, si es necesario utilice procedimientos sanitarios y evite el exceso de tracción.

- Calificar la condición corporal de todas las vacas recién paridas.

- Tomar la temperatura de todas las vacas diariamente durante diez días para identificar oportunamente las vacas enfermas y tratarlas con **DEPOMYCINE**®

- Administre **FERTAGYL**® entre los días 14 a 20 días posparto para reducir los días a la concepción y los servicios por concepción.

- Administre **METRICURE**® - **TONOFOSFAN**® a partir del día 21 posparto para mejorar la fertilidad.


- Tratar la mastitis infecciosa con **MASTIJET**® - **FORT**

Relación entre la eliminación de *A. pyogenes* y la fertilidad



La eliminación de *A. pyogenes* después del tratamiento con **METRICURE**® resultó en una oportunidad 3 veces más alta de concepción a la primera inseminación y una oportunidad 5 veces más alta de gestación dentro de los 200 días posparto comparado con vacas que permanecieron con la infección de *A. pyogenes*.

Hallazgos bacteriológicos en muestras uterinas de vacas con metritis subaguda y crónica



Las vacas tratadas a los 21 días posparto con **METRICURE**® obtuvieron una oportunidad de gestación 1.7 mayor que las que se trataron hasta los **90 DÍAS POSPARTO**

La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tlanguistenco, C.P. 52600 Edo. de México, Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com Oficinas Interlomas, Departamento Técnico, Tel: 5290 2527 Fax: 5290 2536

241021 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional



intervet