

Bandvet[®] creme

La Marca del Cicatrizante

Tan efectivo como el cariño
que le das a tus pacientes.



Efectivo



Rápido



Seguro



Estético

El cicatrizante altamente efectivo e



DÍA 1: Herida por desprendimiento de piel en perro. Inicio del tratamiento con **Bandvet®** creme.



DÍA 5: Tejido de granulación posterior al debridamiento de la herida.



DÍA 12: Aspecto de la herida con tejido de granulación.

1. Dra. Julia Matera, et. al., Ensaio de avaliação de eficácia e de exequibilidade de uso do creme ou gaze impregnada com *Triticum vulgare* em feridas.



Eficaz

Fácil de aplicar, favorece la cicatrización por primera y segunda intención.^{1,2}



Rápido

Un sólo producto con 2 acciones cicatrizante y desinfectante.^{1,2}

Bandvet® creme es una pomada cicatrizante en crema a base de extractos de origen vegetal (*Triticum vulgare* "Fitoestimulinas" y 2-fenoxietanol) para aplicación tópica para el tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras, entre otras lesiones de la piel de los animales domésticos como perros, gatos, caballos, ovinos, bovinos y porcinos.

Recomendado para el tratamiento tópico de todas las alteraciones del tejido dérmico que requieren reactivación de la neoformación epitelial o que impliquen una alteración químico-histológica: heridas en general, alteraciones úlcero distróficas (úlceras de decúbito, úlceras varicosas, úlceras crónicas, heridas tórpidas); cicatrización retardada de heridas; cirugía, dermatosis, ulceraciones del pezón durante la lactancia, laceraciones y erosiones en la piel.^{1,2}

Bandvet® creme... El cicatrizante MULTIESPECIE de resultados rápidos y cosméticos

n tiempo y calidad de cicatrización.



con epitelización parcial y
1.



DÍA 15: Anaplastia – avance de regeneración de piel.



DÍA 23: Aspecto de la cicatrización de la herida posterior a la anaplastia y aplicación diaria de **Bandvet®** creme.

las cutáneas. 1ª Fase Experimental. 2ª Fase Clínica, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 2000.



Seguro

Amplio rango de seguridad, ya que no provoca efectos secundarios tópicos o sistémicos.^{1,2}



Estético

Promueve cicatrización de buena calidad y además cosmética.^{1,2}

Las fitoestimulinas o bioestimulinas de origen vegetal, estimulan la síntesis de RNAm y DNA en fibroblastos y activan la reepitelización de los tejidos. El ***Triticum vulgare*** ejerce una acción favorecedora y estimuladora de la reepitelización y de los procesos de reparación tisular a través de la estimulación de la formación, maduración y migración de fibroblastos, lo que conduce a una rápida síntesis de tejido de granulación vital. Proporciona las condiciones para una reepitelización rápida y eficiente.^{1,2}

El fenoxietanol (éter glicoletilenmonofenólico) ejerce una potente actividad antibacteriana especialmente contra patógenos Gram negativos, en particular ***Pseudomona aeruginosa***, por lo cual reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la terapéutica antimicrobiana.^{1,2}

uticos.



Bandvet® creme
La Marca del Cicatrizante

Bandvet® creme

La Marca del Cicatrizante



Forma de Uso:

Limpiar la región afectada y aplicar dos veces al día una cantidad suficiente de **Bandvet®** creme para cubrir la lesión. El tratamiento debe continuarse hasta que la lesión haya desaparecido. Dependiendo de la localización y severidad de la lesión, se recomienda cubrir la lesión con una gasa estéril empapada con **Bandvet®** creme, facilitando así la administración del producto.

Advertencias:

El producto está contraindicado en animales con hipersensibilidad específica a los ingredientes activos del producto.

Bandvet® creme presenta un amplio margen de seguridad, siendo rápidamente absorbido a través de la piel sin riesgos para el paciente. No presenta ninguna limitación de uso o contraindicación.^{1, 2}

Consulte al Médico Veterinario para la correcta prescripción y administración del producto.

El uso prolongado de cualquier producto tópico puede causar reacciones de hipersensibilidad, si esto ocurre el tratamiento con **Bandvet®** creme debe ser interrumpido.

Condiciones de Almacenamiento:

Bandvet® creme debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, al abrigo de los rayos solares.

Conservar fuera del alcance de los niños.

La vida de anaquel del producto es de 36 meses a partir de la fecha de manufactura.

Presentación:

Tubo de: 20 g

Referencias Bibliográficas:

1. Dra. Julia Matera, et. al., Ensaio de avaliação de eficácia e de exequibilidade de uso do creme ou gaze impregnada com *Triticum vulgare* em feridas cutâneas. 1ª Fase Experimental. 2ª Fase Clínica, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 2000.
2. Daniela Luque de Souza Oliveira e Leandro Augusto de Oliveira, et. al., Uso de creme à base de *Triticum vulgare* (Bandvet® - Schering-Plough) em ferida de grande extensão - Relato de caso.



Bandvet® creme
Reg. SAGARPA: Q-0552-119

Para mayor información contacte a su representante Intervet/Schering-Plough Animal Health. Consulte al Médico Veterinario