

Intervet


*marca la
diferencia*

Cuando la resistencia es evidente.....

Gentagil[®] Fortius

Gentamicina inyectable para bovinos y cerdos

... asegura la salud permanente



L I N E A A N T I B I O T I C O S

Gentagil® Fortius

Es un antibiótico en solución acuosa listo para inyectarse a base de gentamicina, que actúa inhibiendo la síntesis protéica de las bacterias. La gentamicina tiene una actividad de amplio espectro, la cual incluye varias bacterias Gram negativas y Gram positivas.

Es efectivo contra: *Staphylococcus* spp., (incluyendo *Staphylococcus aureus*), *Streptococcus* spp., *Proteus* spp., *Aerobacter* spp., *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*.

Características

- Debido a su mecanismo de acción, es efectivo contra microorganismos resistentes a B-Lactámicos (sensibles a gentamicina).
- El pico de concentración en plasma se alcanza a los 30-60 minutos después de la administración intramuscular.
- Tiene una alta distribución en tejido pulmonar, urinario, pleura, peritoneo, bilis y líquido sinovial.
- A la dosis recomendada se obtienen niveles plasmáticos por 24 horas.
- El 90% del antibiótico es eliminado por riñón.

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:

Sulfato de gentamicina	166 mg
(Equivalente a 100 mg de gentamicina base)	
Vehículo y excipiente c.b.p.	1 ml

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones bacterianas como:

Neumonía por *Pasteurella*, *Manheimia* (antes *Pasteurella haemolytica*), *Haemophilus*, *Streptococcus*, *Bordetella* y *Mycoplasma*.

Enteritis por *Clostridium*, *E. coli*, *Salmonella*..

Septicemias por *Staphylococcus*, *Streptococcus* y *Pasteurella*; así como poliartitis, otitis, oftalmítis, abscesos e infecciones pos-operatorias.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos:	0.3 ml/ 10 kg de peso
Cerdos y lechones:	0.3-0.6 ml/ 10 Kg de peso


El primer día del tratamiento administrarlo cada 12 horas, y continuar cada 24 horas por lo menos 3 días más o hasta que desaparezcan los signos clínicos. Se debe administrar por vía intramuscular.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne:	49 días (bovinos y cerdos) 35 días (aves de corral)
Leche:	48 horas

PRESENTACIÓN:

Frascos de 100 ml y 500 ml.



La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México, Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com.mx Oficinas Interlomas, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536

