

Intervet

*marca la
diferencia*

Porcilis®

*Vacunas diseñadas
para el nuevo milenio*




L I N E A P O R C I C O L A

El antígeno preciso para la respuesta exacta

Porcilis® Coli

La vía natural para proteger lechones


- *Escherichia coli* está presente en todas las granjas.
- Reduzca gastos de medicación en lechones y aumente su número y peso al destete.
- Usted vacuna a 1 cerda... y protege a 7, 8, 9, 10 lechones a la vez.
- Piénselo e invierta en prevención de una vez, en lugar de gastar en curar.



Porcilis® APP la única vacuna a base de toxoides purificados (ApxI, ApxII, ApxIII) y la proteína de membrana externa con lo que se obtiene protección contra cualquier serotipo conocido de *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

La inmunidad generada por Porcilis® APP:

- Reduce la mortalidad por App
- Aumenta la ganancia diaria de peso de manera significativa
- Mejora la conversión alimenticia
- Acelera la salida a mercado
- Ahorra gastos por medicación excesiva



COMPOSICIÓN

Contiene el toxoide **LT** y los antígenos purificados **K88ab**, **K88ac**, **K99** y **987P** de cepas enteropatógenas de *E. coli*.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Vacunación básica:

En granjas sin antecedentes de vacunación, vacunar 2 veces a todo el pie de cría, con un intervalo de 6 semanas entre cada vacunación. Estos animales no requerirán de revacunación durante 3 meses, posteriormente se incorporarán al programa del pie de cría de la granja. Este programa debe aplicarse también a los animales de reemplazo.

Pie de cría:

Entre 3 y 4 semanas antes de cada parto.

Reemplazos:

2 vacunaciones con un intervalo de 6 semanas y un refuerzo 3 ó 4 semanas antes del primer parto.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cerdas adultas y primerizas: 2 ml
Aplicar por vía intramuscular profunda

PRESENTACIÓN

Frasco de 50 ml (25 dosis).



Reg: SAGAR B-0273-043

COMPOSICIÓN

Contiene las subunidades antigénicas: Toxoides Apx I, Apx II y Apx III, además de una proteína de la membrana externa (OMP-A2KD), producido específico del *Actinobacillus pleuropneumoniae*

CALENDARIO DE VACUNACIÓN:

Los cerdos pueden ser vacunados desde 6 semanas de edad.

Se requieren dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas entre sí.

Para el programa más adecuado de su granja, consulte al Médico Veterinario Zootecnista

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar 2 inyecciones de 2 ml c/u: la primera por vía subcutánea o intramuscular y la segunda por vía intramuscular profunda.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 100 ml (50 dosis).



Reg: SAGAR B-0273-086

Porcilis® AR-T

Vacuna elaborada a base de la toxina dermonecrótica de *Pasteurella multocida* y cepa virulenta inactivada de *Bordetella bronchiseptica*, en cantidades precisas para generar una alta respuesta inmune. Esta vacuna ha sido utilizada con éxito en programas de erradicación de la rinitis atrófica.

La inmunidad que confiere la cerda vacunada con **Porcilis® AR-T** a su camada evita que la toxina dermonecrótica de *Pasteurella multocida* y/o *Bordetella bronchiseptica* dañen el delicado epitelio del lechón cuyos turbinados se encuentra aún en crecimiento. Esto ocurre aún cuando en los lechones estén presentes virus inmunodepresores. Se previene de manera eficaz la presentación de la rinitis atrófica durante toda la vida productiva de los cerdos. Es obvio el beneficio que se obtiene al evitar la atrofia de los cornetes ya que éstos ayudarán al cerdo a evitar la futura entrada masiva de agentes infecciosos al tracto respiratorio, lo que se refleja en:

- Lechones más sanos y mejor prevenidos para problemas respiratorios
- Mayor peso al destete
- Rápido arribo al peso de mercado
- Ahorro en el uso de antibióticos
- Mejores ganancias en peso y en pesos

Resultados de pruebas de desafío

Grupo de lechones madre vacunada con PORCILIS®ART	desafiados	Núm de lechones muertos 1-8 días después del desafío	Peso promedio al destete (kg)	Peso promedio a las 10 semanas de edad (kg)
sí	sí	–	8.51	34.94
no	sí	6	6.41	20.25
no	no	–	8.34	31.07

COMPOSICIÓN

Contiene una cepa de *B. bronchiseptica* y el toxoide (DNT+) de la *P. multocida* tipo D toxigénica.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Vacunación básica:

En granjas sin antecedentes de vacunación, vacunar 2 veces a todo el pie de cría, con un intervalo de 6 semanas entre cada vacunación. Estos animales no requerirán de revacunación durante 3 meses, posteriormente se incorporarán al programa del pie de cría de la granja. Este programa debe aplicarse también a los animales de reemplazo.

Pie de cría:

Entre 3 y 4 semanas antes de cada parto.

Reemplazos:

2 vacunaciones con un intervalo de 6 semanas y un refuerzo 3 o 4 semanas antes del primer parto.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cerdas adultas y primerizas: 2 ml

Aplicar por vía intramuscular profunda.

PRESENTACIÓN

Frasco de 50 ml (25 dosis).



Reg: SAGAR B-0273-062



La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México, Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com.mx Oficinas Interlomas, Departamento Técnico, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536

