

**Intervet**

*marca la  
diferencia*

**Rank Plus Pasta**

**Panacur Pasta Compuesta**

**Panacur Suspensión al 10%**

**Panacur Granulado al 22%**

*La combinación precisa para **prevenir los cólicos**  
causados por parásitos*



**L I N E A   E Q U I N O S**

Los desparasitantes Intervet evitan los daños producidos por las larvas y

## Efectividad contra los parásitos más importantes

**Rank Plus Pasta**  
(ivermectina + pamoato de pirantel)  
Reg SAGARPA Q-0273-209

**Panacur Pasta Compuesta**  
(fenbendazol + triclorfón)  
Reg SAGAR Q-0273-163

**Panacur Suspensión al 10%**  
(fenbendazol)  
Reg SAGAR Q-0273-167

**Panacur Granulado al 22%**  
(fenbendazol)  
Reg SAGAR Q-0273-160

### 1. Estrongilidosis por grandes estróngilos

*Strongylus vulgaris* (huevos)

*Strongylus vulgaris* (L3 y L5 arterial)

*Strongylus vulgaris* (adultos)

*Strongylus edentatus* y *S. equinus* (huevos)

*Strongylus edentatus* y *S. equinus* (estadíos tisulares)

*Strongylus edentatus* y *S. equinus* (adultos)

### 2. Estrongilidosis por ciatostomas

Huevos

Larvas L3 tempranas enquistadas

Larvas L3 tardías y L4 enquistadas

Adultos

### 3. Parascariosis

*Parascaris equorum* (Huevos)

*Parascaris equorum* (Larvas L2 y L5 en intestino)

*Parascaris equorum* (Larvas L3 y L4 en pulmones)

*Parascaris equorum* (Adultos)

### 4. Gastrofilosis

*Gasterophilus* spp (Larvas L1 y L2 en boca y faringe)

*Gasterophilus* spp (Larvas L2 y L3 en estómago)

	Rank Plus Pasta	Panacur Pasta Compuesta	Panacur Suspensión al 10%	Panacur Granulado al 22%
<i>Strongylus vulgaris</i> (huevos)				
<i>Strongylus vulgaris</i> (L3 y L5 arterial)				
<i>Strongylus vulgaris</i> (adultos)				
<i>Strongylus edentatus</i> y <i>S. equinus</i> (huevos)				
<i>Strongylus edentatus</i> y <i>S. equinus</i> (estadíos tisulares)				
<i>Strongylus edentatus</i> y <i>S. equinus</i> (adultos)				
<b>2. Estrongilidosis por ciatostomas</b>				
Huevos				
Larvas L3 tempranas enquistadas				
Larvas L3 tardías y L4 enquistadas				
Adultos				
<b>3. Parascariosis</b>				
<i>Parascaris equorum</i> (Huevos)				
<i>Parascaris equorum</i> (Larvas L2 y L5 en intestino)				
<i>Parascaris equorum</i> (Larvas L3 y L4 en pulmones)				
<i>Parascaris equorum</i> (Adultos)				
<b>4. Gastrofilosis</b>				
<i>Gasterophilus</i> spp (Larvas L1 y L2 en boca y faringe)				
<i>Gasterophilus</i> spp (Larvas L2 y L3 en estómago)				

# adultos de los parásitos más peligrosos:



Reg SAGARPA Q-0273-209

## Rank Plus Pasta

(ivermectina + pamoato de pirantel)



Reg SAGAR Q-0273-163

## Panacur Pasta Compuesta

(fenbendazol + triclorfón)



Reg SAGAR Q-0273-167

## Panacur Suspensión al 10%

(fenbendazol)



Reg SAGAR Q-0273-160

## Panacur Granulado al 22%

(fenbendazol)

### 5. Cestodosis

*Anoplocephala perfoliata*  
(Adultos)



*Anoplocephala magna*  
(Adultos)




### 6. Oxiuridosis

*Oxyuris equi* (Adultos)




*Oxyuris equi* (Larvas L3 y L4)




### 7. Habronemosis

*Habronema muscae* (Adultos en estómago)



*Habronema muscae* (Larvas en piel)



*Habronema majus* (Adultos en estómago)



*Habronema majus* (Larvas en piel)



*Draschia megastoma* (Adultos en estómago)




*Draschia megastoma* (Larvas en piel)






### 8. Tricostrongilosis

*Trichostrongylus axei* (Adultos en estómago)




### 9. Oncocercosis

*Onchocerca cervicalis* (Microfilarias y adultos)



### 10. Estrongiloidosis

*Strongyloides westeri* (Adultos)



Eficacia de 90 a 100%

Único eficaz al 98%

Eficacia de 85.3 a 100% a dosis única de 6.6 mg / kg pv de pamoato de pirantel\*

\*Grisi, L. "Evaluación de la eficacia de la combinación de ivermectina y pamoato de pirantel en el control de la infestación natural por cestodos en equinos. Prueba modificada" Univ. Fed. Rural de Rio de Janeiro, Depto. de Parasitología Animal. 1996

Klei, T. "Current Thoughts on Parasite Induced Colic" Conferencia en el XXIII Congreso Nacional de la AMMVEE, Guanajuato, Gto. 2001

	<b>DESPARASITAR</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS</b>
<b>Potrillos</b> de 1 a 6 meses	Cada 30 días (1 vez al mes)	<b>Rank Plus Pasta</b> ó <b>Panacur Suspensión al 10%</b> ó <b>Panacur Granulado al 22%</b>	6.25 g (1/4 de jeringa) / 125 kg p.v.  8 ml /100 kg p.v. con jeringa dosificadora.  1/2 sobre / 125 kg p.v. en el alimento.
<b>Potros</b> de 6 meses a dos años	Cada 60 – 90 días (1 vez cada 2 ó 3 meses )	<b>Rank Plus Pasta</b> ó <b>Panacur Pasta Compuesta</b> ó <b>Panacur Suspensión al 10%</b> ó <b>Panacur Granulado al 22%</b>	12.5 g (1/2 de jeringa) / 250 kg p.v.  13 g (1/2de jeringa) 250 kg p.v.  25 ml / 300 kg p.v. con jeringa dosificadora o con sonda.  1 sobre / 250 kg p.v en el alimento o con sonda.
<b>Potros</b> de 2 años en adelante	Cada 2 ó 3 meses	<b>Rank Plus Pasta</b> ó <b>Panacur Pasta Compuesta</b> ó <b>Panacur Suspensión al 10%</b> ó <b>Panacur Granulado al 22%</b>	25 g (1 jeringa) /500 kg p.v.  26 g / (1 jeringa) 500 kg  40 ml 500 kg / p.v. con jeringa dosificadora o con sonda.  2 sobres 500 kg /p.v. en el alimento o con sonda.
<b>Sementales</b> <b>Yeguas vacías</b>	Cada 2 ó 3 meses	<b>Rank Plus Pasta</b> ó <b>Panacur Pasta Compuesta</b> ó <b>Panacur Suspensión al 10%</b> ó <b>Panacur Granulado al 22%</b>	25 g (1 jeringa) / 500 kg p.v.  26 g (1 jeringa) /500 kg p.v.  40 ml / 500 kg p.v. con jeringa dosificadora o con sonda.  2 sobres / 500 kg p.v. en el alimento o con sonda.
<b>Yeguas gestantes</b>	Cada 2 ó 3 meses	<b>Rank Plus Pasta</b> ó <b>Panacur Suspensión al 10%</b> ó <b>Panacur Granulado al 22%</b>	25 g (1 jeringa) / 500 kg p.v.  40 ml / 500 kg p.v. con jeringa dosificadora.  2 sobres / 500 kg p.v. en el alimento.
	Además un mes antes de la fecha probable de parto	<b>Rank Plus Pasta</b> ó <b>Panacur Suspensión al 10%</b> ó <b>Panacur Granulado al 22%</b>	25 g (1 jeringa) / 500 kg p.v.  40 ml / 500 kg p.v. con jeringa dosificadora.  2 sobres / 500 kg p.v. en el alimento.

p.v. = Peso Vivo



*La investigación Intervet marca la diferencia*

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista  
**Intervet México, S.A. de C.V.** Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México,  
 Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com **Oficinas Interlomas**, Departamento Técnico, Tel:5290 2527 Fax: 5290 2536



040504 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional