


Sitios recomendados para la aplicación de productos inyectables y la identificación del fibrosarcoma maligno en gatos

La Asociación Americana de Médicos en Felinos (AAFF) y la Academia de Medicina Felina (AFM) recomiendan estandarizar los protocolos de vacunación (sitio, tipo de vacuna y laboratorio productor) para identificar la causa del fibrosarcoma maligno.



Nota. La región escapular no es recomendada para vacunación.

Nobivac® Forcat

DESCRIPCIÓN:
Es una vacuna combinada a virus vivo modificado y liofilizado para la prevención de las enfermedades producidas por el calicivirus, la rinotraqueitis, la panleucopenia felina y la clamidiasis (*Chlamydophila felis*) en gatos.

COMPOSICIÓN:
Contiene las cepas atenuadas de los virus de la rinotraqueitis, el calicivirus, la panleucopenia y la cepa de *Chlamydophila felis*, desarrollada en cultivos de tejidos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular. Reconstituir con diluyente estéril.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN:
La vacunación puede iniciar a edades tempranas desde las 6 semanas de vida continuando con una revacunación del mismo biológico 2 ó 3 semanas después, terminando a las 12 semanas de vida con la vacuna antirrábica.

PRESENTACIÓN:
Caja con 5 frascos de 1 dosis (5 frascos con pastilla liofilizada y 5 frascos con diluyente estéril)

PRECAUCIONES: • Solo vacunar animales sanos



Nobivac® Tricat

DESCRIPCIÓN:
Es una vacuna combinada a virus vivo modificado y liofilizado para la prevención de las enfermedades producidas por el calicivirus, la rinotraqueitis y la panleucopenia felina en gatos.

COMPOSICIÓN:
Contiene las cepas atenuadas de los virus de la rinotraqueitis, el calicivirus y la panleucopenia felina, desarrollada en cultivo de tejidos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Puede reconstituirse ya sea con el diluyente estéril o con **Nobivac® Rabia**.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN:
Administre a partir de las 8 semanas de edad. Puede administrarse durante la gestación.

PRESENTACIÓN:
Caja con 5 frascos de 1 dosis (5 frascos con pastilla liofilizada y 5 frascos con diluyente estéril).

PRECAUCIONES: • Consérvese en refrigeración entre 2 y 4° C • No congelar



Nobivac® Rabia

DESCRIPCIÓN:
Es una vacuna a virus inactivado en suspensión acuosa para la prevención de la rabia en perros y gatos.

COMPOSICIÓN:
Contiene la cepa clonada Pasteur R1VM/PTA, inactivada con betapropiolactona y como adyuvante el fosfato de aluminio.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Puede Utilizarse para reconstituir la **Nobivac® Tricat**.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN:
Revacunación anual, en animales de tres meses se recomienda administrar una dosis 5 ó 6 meses después. Puede administrarse en hembras gestantes.

PRESENTACIÓN:
Caja con 10 frascos de 1 dosis.



Intervet
marca la diferencia



Nobivac® Tricat
Nobivac® Forcat
Nobivac® Rabia

Porque no hay pretextos para una completa protección

La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista **Intervet México, S.A. de C.V.** Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México, Tel: 01 (713) 1350 300 Fax: 01 (713) 1350 354 www.intervet.com.mx **Oficinas InterIomas**, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536

290404 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional



PEQUEÑAS ESPECIES



La importancia de la socialización

Los gatos son considerados como una especie con marcada independencia, gran parte de los propietarios de estos animales están conscientes que una segura y temprana socialización durante los periodos sensibles de su vida (2 – 9 semanas), depende en forma fundamental para que aprenda a identificarse como felino e interactúe adecuadamente con los humanos, su nuevo hogar y otros individuos de su especie.

Razón por la cual es necesario proveerle de una adecuada protección inmunológica contra las principales enfermedades infecciosas que los afectan (digestivas, respiratorias, etc.)

Agentes infecciosos

involucrados en las principales enfermedades de los gatos

	Principales signos clínicos ante la enfermedad
<i>Calicivirus felino</i>	Fiebre, ulceración oral, conjuntivitis
<i>Chlamydia psittaci</i> (<i>Chlamydophila felis</i>)	Conjuntivitis, rinitis
<i>Rinotraqueitis felina</i>	Descarga óculo-nasal, ulcera corneal (puede presentar abortos, reabsorción fetal en hembras preñadas)
<i>Herpes virus felino</i>	Rinitis crónica
<i>Panleucopenia felina</i>	Fiebre, temblores, anorexia y vómitos
<i>Rabia</i>	Fotofobia, hidrofobia y/o agresividad

Nobivac® Tricat

✓ *Amplia protección contra la panleucopenia felina e incluso contra desafíos a subtipos 2a¹ y 2b de parvovirus canino (PVC), en gatos.*

✓ *Inmunidad prolongada contra desafíos de campo.*

✓ *Eficacia contra las cepas de campo que provocan las enfermedades del calicivirus y la rinotraqueitis.*

¹ Los tipos antigénicos de parvovirus canino 2a y 2b infectan a gatos. U. Truyen, Parvovirus canino, ivis.org, 2000.

Nobivac® Forcat

✓ *Mismos antígenos de Nobivac® Tricat, ahora con el plus de Chlamydia psittaci (Chlamydophila felis).*

✓ *Protección sólida incluso contra subtipos 2a y 2b del PVC.*

✓ *Seguridad en gatitos incluso desde las 4 semanas de edad.*

✓ *Protección por 3 años a Panleucopenia felina.*

Nobivac® Rabia

✓ *La combinación ideal Nobivac® Rabia + Nobivac® Tricat (cuádruple felina).*

✓ *La rabia es una enfermedad altamente contagiosa.*

✓ *La rabia es una enfermedad zoonótica.*

¡**Nobivac® Rabia, versátil al poder aplicarse sola o combinada con Nobivac® Tricat!**

Nobivac®

la mejor herramienta para una excelente inmunidad

COMPONENTES					
Biológico	VPLF	VCF	<i>C. psittaci</i>	VRF	Rabia
Rabia					X
Tricat	X	X		X	
Forcat	X	X	X	X	
Tricat + Rabia	X	X		X	X

VPLF = Virus de la panleucopenia felina
VCF = Virus del calicivirus felino *C. psittaci* = *Chlamydia psittaci* hoy *Chlamydophila felis*
VRF = Virus de la rinotraqueitis felina



Y contra las enfermedades parasitarias...

Panacur® Plus tabletas

Antiparasitario oral de amplio espectro contra

- Nematodos
- Cestodos
- Protozoarios

En gatos adultos, hembras gestantes y gatitos desde los 15 días de edad...