

**intervet**

*marca la  
diferencia*

*Ahuyenta a*

# **LAS MOMIAS**



**PORCILIS<sup>®</sup>  
PARVO-7L-E**

**9** *antígenos en*  
**DILUVAC<sup>®</sup> FORTE**  
*le dan una confiable*  
*re...producción*



L I N E A P O R C I C O L A

# PORCILIS® PARVO-7L-E

9 antígenos en DILUVAC® FORTE le dan una confiable re...producción

- n El más amplio espectro de protección
- n Diluvac® Forte adyuvante patentado inmunomodulador
- n En envase PET irrompible y transparente que permite visualizar el contenido
- n Fácil aplicación por un menor volumen de dosis y adyuvante acuoso

**Fórmula:** Contiene antígenos inactivados de *Erisipelothrix rhusiopathiae*; *Parvovirus Porcino* y 7 serovariedades de *Lepstospira interrogans* (*L. bratislava*; *L. tarassovi*; *L. icterohemorrhagiae*; *L. pomona*; *L. canicola*, *L. grippotyphosa* y *L. hardjo*)

**Indicaciones:** Vacuna inactivada y suspendida en adyuvante Diluvac® Forte para la prevención de Parvovirus, Leptospirosis y Erisipelosis porcina

**Calendario de vacunación:** Hembras de reemplazo: deben tener 2 vacunaciones antes del primer servicio. Se recomienda que la primera dosis se aplique en animales mayores de 6 meses de edad. Dando un refuerzo 4 semanas después de la primera dosis, es deseable que la segunda dosis se aplique 2 semanas antes del primer servicio

**Pie de cría:** Aplicar entre las 2 y 4 semanas antes de cada servicio

**Sementales:** Una dosis cada 6 meses

**Dosis:** 4 ml vía intramuscular



Presentación:  
Frasco con 10 y 50 dosis  
(40 y 200 ml)  
Registro en trámite



*La investigación Intervet marca la diferencia*

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México,  
Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com Oficinas Interlomas, Departamento Técnico, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536

