

¿ Cómo socializar en forma segura a la mascota ?

Es importante buscar una respuesta inmune primaria en cachorros desde la primera dosis, la cual depende en gran parte de la calidad y tipo de cepa utilizada ya que ésta se encuentra estrechamente relacionada con el éxito al desafío.

Todas las vacunas Nobivac® de Intervet que contienen la fracción de parvovirus canino (PVC) tienen la cepa 154, la única clonada que ofrece en cada dosis alta masa antigénica, dando protección contra los tipos de PVC (PVC 2, PVC-2a y PVC-2b), la fracción de distemper canino contienen la cepa Onderstepoort cultivada en embrión de pollo con elevada masa antigénica, la cual mantiene alta seguridad y eficacia para los cachorros, evitando reversión a la virulencia y cuadros de encefalitis postvacunal, por estas características puede ser aplicada en hurones.

Nobivac® Puppy DP y Parvo-C



Nobivac®Puppy DP y Parvo-C únicas vacunas aprobadas por la USDA* para ser aplicadas desde las 4 semanas de edad

Características ideales de un biológico para una socialización segura.

- Cepa 154 (patentada por Intervet)
- Cepa Clonada
- Mayor seroconversión a edades tempranas
- Generación de anticuerpos específicos
- Mismas características en todas sus fracciones de antígenos y lotes
- Antígenos contra las enfermedades más importantes durante la socialización del cachorro (distemper - parvovirus)
- Alta masa antigénica
- Bajo pasaje
- Recomendadas por expertos
- Protección en menos tiempo (últimas dosis del calendario básico de vacunación en las 12 semanas para cualquier antígeno)

*(United States Department of Agriculture)



Reg. SAGARPA: B-0273-057

Reg. SAGARPA: B-0273-049

Socialización segura
un beneficio más de las vacunas de Intervet

Intervet
marca la
diferencia

Linea de biológicos **Nobivac®**

Una socialización segura...



...lo marca para toda la vida

ANIMALES DE COMPAÑIA

con **Intervet**

La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes N.º 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México,
Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com.mx Oficinas Inter-lomas, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536

250603 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional



Intervet



La importancia de la socialización

La etapa más importante en el desarrollo de un perro es el inicio de su socialización, ya que durante esta etapa de su vida el cachorro adquiere experiencias fundamentales para definir su carácter, personalidad y temperamento (potencial como mascota de calidad). De aquí la importancia de proveerle un proceso adecuado de **socialización temprana** en un ambiente rico en estímulos.¹

Uno de los compromisos del Médico Veterinario es el de orientar al propietario sobre como realizar una socialización adecuada. La falta o inadecuada socialización de la mascota es el origen de un mal comportamiento. Esta situación también provoca insatisfacción en el propietario, que termina en falta de interés en la mascota y la poca o nula asistencia al consultorio.

Para lograr una **socialización** adecuada, se deberá ofrecer una protección **segura** contra las principales enfermedades infecciosas a las que se enfrenta un cachorro (distemper y parvovirus) situación que se logra a través de la inmunización. El uso de la vacuna adecuada que lo proteja de estas enfermedades, le permitirá su adaptación en el hogar, en el ambiente externo y la interacción con perros e individuos de otras especies, situación que lo marca para toda la vida

¹ The association of Pet Behaviour Counsellors (www.apbc.org.uk)

Consideraciones para establecer el inicio del calendario de vacunación orientado a una socialización segura

Edad del cachorro	4 semanas	6 semanas
Programa cerrado vacunación cada 15 días	<ul style="list-style-type: none"> • Origen desconocido • Destete precoz 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto valor del cachorro • Altos desafíos • Socialización temprana del cachorro
	<p>En criaderos Alto valor de la mascota Razas susceptibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto riesgo 	
Programa abierto vacunación cada 21 días	<ul style="list-style-type: none"> • Brotes • Socialización temprana del cachorro 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Destete precoz • Ambiente sano • Escasos desafíos • Socialización temprana del cachorro 	<ul style="list-style-type: none"> • Confianza de cuidado sobre el cachorro • Ambientes sanos • Escasos desafíos • Socialización temprana del cachorro

Vacunación adecuada

Expertos veterinarios en pequeñas especies, recomiendan utilizar como primera vacuna en cachorros, a aquellas que contengan solamente las fracciones de moquillo y parvovirus canino (VDC y VPC2)², este último clonado.^{2,3,4}

² L.E.Carmichel: Canine viral vaccines at a turning point Advances in Veterinary Medicine, vol. 41, 1999
³ Schultz R. planes de vacunación canina y felina actuales y futuros XXIII WSAVA, 1998.
⁴ Schultz. Considerations in Designing Effective and safe Vaccination Programs for Dogs (last updated: 5 - may - 2000)

La importancia de la clonación en las vacunas es... que la cepa vacunal al ser biologicamente clonada ofrecerá una población viral más estable y uniforme a fin de asegurar una eficacia constante.⁵

⁵ L.E.Carmichel: Canine viral vaccines at a turning point. Advances in Veterinary Medicine, vol.41,1999.



Temperamento



Carácter



Personalidad

¡Únicas vacunas con seguridad y eficacia desde las 4 semanas de edad!

Los biológicos Nobivac® permiten la combinación entre si, (incluso en la misma jeringa) satisfaciendo cualquier esquema de vacunación



Línea de vacunas Nobivac®

Liofilizadas

Líquidas

Nobivac® permite terminar calendarios de vacunación de todos los antígenos a las 12 semanas de edad, preparando al cachorro contra los diferentes desafíos presentes durante la socialización.



Segura socialización temprana, sólo con Intervet