

Estimado dueño

Su Médico Veterinario le ha recetado **IBAFLIN®** Gel a su mascota. Es un antibiótico en forma de gel palatable. La ventaja de **IBAFLIN®** Gel sobre los comprimidos es que su mascota aceptará **IBAFLIN®** Gel sin problemas.

*En este folleto le explicamos en que consiste **IBAFLIN®** Gel y lo fácil que es administrarlo.*

IBAFLIN® Gel, el antibiótico

IBAFLIN® Gel contiene ibafloxacin, que pertenece a la clase de antibióticos llamados “fluoroquinolonas”. Las fluoroquinolonas se encuentran entre los antibióticos más eficaces en la medicina veterinaria. Se usan para tratar las infecciones bacterianas más comunes, como las infecciones de la piel, la vejiga, los pulmones, y las vías respiratorias. Tienen la ventaja añadida de solo administrarse una vez al día, caso contrario con muchos otros antibióticos.



IBAFLIN® Gel

Las ventajas de ser un palatable

Puede que usted ya haya intentado darle comprimidos a su mascota. Si es así, sabrá que los comprimidos no son siempre fáciles de administrar. Es muy difícil colocar un comprimido directamente en el hocico, sobre todo en los gatos. ¡Y si intenta esconder el contenido dentro de la comida, siempre lo encuentra!

IBAFLIN® Gel es mucho más fácil de administrar. **IBAFLIN®** Gel se mezcla fácilmente con la comida, la mayoría de los perros y los gatos ni siquiera notarán que se ha añadido **IBAFLIN®** Gel en su alimento.

Si su mascota no come debido a su enfermedad se le puede administrar el gel directamente en el hocico.

IBAFLIN® Gel se almacena a temperatura ambiente, incluso cuando ya está abierto

Como administrar la dosis correcta

El primer paso es ajustar el anillo (B) del émbolo en el número adecuado de mililitros (A), en el émbolo las marcas de punto equivalen a 0.5 ml y las rayas a 1 ml. Ej. un perro/gato de 4 kg de p.c. deberá recibir 2 ml de gel por día; 1^{er} día antes de dar el tratamiento - el anillo debe moverse hasta la segunda raya después del número “0”; 2^{do} día el anillo se mueve hasta la raya “4”; 3^{er} día se coloca en la raya número “6” y así sucesivamente.



*La administración de **IBAFLIN®** Gel es tan sencilla, que hace mucho más factible el seguimiento del tratamiento.*

Como administrar

Administrar el gel con la comida

Una vez que el anillo se ha situado en la posición correcta en la jeringa, tome una pequeña cantidad de alimento (aproximadamente un tercio de una toma normal) y presione el gel sobre la comida hasta que el anillo alcance el cuello de la jeringa y no vaya más allá. Mezcle **IBAFLIN®** Gel con la comida. Cuando su mascota se haya comido esta mezcla puede darle el resto de la comida.

Administrar el gel directamente en el hocico.

Ajuste el anillo en la jeringa para administrar la cantidad correcta de **IBAFLIN®** Gel. Sujete a su gato o la cara de su perro con suavidad, coloque la punta de la jeringa en la comisura del hocico y presione el émbolo hacia abajo con cuidado hasta que el anillo alcance el cuello de la jeringa. Sujete a su mascota con suavidad durante unos segundos más hasta que se asegure de que se ha tragado todo el gel.



Instrucciones de uso

Por kilogramo de peso corporal

Siga atentamente las instrucciones que ha recibido y administre **IBAFLIN®** Gel a su mascota durante el periodo prescrito por su Médico Veterinario.

Nombre del perro /gato _____

Peso del perro /gato kg

Cantidad de **IBAFLIN®** Gel al día ml

Durante un período de días

La dosis es de 1 ml de **IBAFLIN®** Gel por 2 kg de peso corporal una vez al día. La tabla inferior le indicará la cantidad de **IBAFLIN®** Gel que necesita administrar a su perro o gato.

IBAFLIN® 3% Gel

Peso (kg)	Cantidad en ml/día
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2
5	2.5
6	3.0
7	3.5
8	4
9	4.5
10	5



Datos Clínica Veterinaria

IBAFLIN® Gel

Consejos

- El mejor momento para administrar **IBAFLIN®** Gel con la comida es dárselo cuando sabe que su perro/gato tiene hambre.
- Si su mascota esta acostumbrada a disponer de comida libremente a lo largo del día, necesitará limitarla una o dos tomas al día durante el tratamiento. Se debe hacer así para asegurarse de que se tome toda la dosis de **IBAFLIN®** Gel al mismo tiempo, para garantizar el óptimo tratamiento.
- Es mejor mezclar el gel con comida en lata (por ejemplo, carne).

Si después de leer este folleto todavía tiene preguntas en relación al uso de **IBAFLIN®** Gel, pregunte a su Médico Veterinario. Estará encantado de proporcionarle más ayuda.



Reg. SAGARPA: Q-0273-012

intervet

marca la
diferencia

Manual para dueños
de perros y gatos

IBAFLIN® Gel



La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco,
C.P. 52600 Edo. de México, Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354
www.intervet.com.mx Oficinas Interlomas, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527
Fax: (55) 5290 2536

intervet



ANIMALES DE COMPAÑÍA