

FICHA TÉCNICA

BACTERINA TRIPLE C.E.S®

Reg. SAGARPA B-0273-134

USO VETERINARIO

1

BACTERINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA PASTEURELOSIS NEUMÓNICA BOVINA (FIEBRE DE EMBARQUE), CARBÓN SINTOMÁTICO (PIERNA NEGRA) Y EL EDEMA MALIGNO

FÓRMULA:

Cada dosis contiene como mínimo:

<i>Pasteurella multocida</i> tipo A y D	2,000 millones de gérmenes
<i>Mannheimia haemolytica</i> A1 y A3	2,000 millones de gérmenes
<i>Clostridium chauvoei</i>	500 millones de gérmenes
<i>Clostridium septicum</i>	500 millones de gérmenes
Vehículo c.b.p	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

Bacterina Triple C.E.S® contiene cultivos inactivados en suspensión de *Pasteurella multocida* tipo A y D, *Mannheimia haemolytica* A1 y A3, *Clostridium chauvoei* y *Clostridium septicum* adsorbidos en hidróxido de aluminio.

INDICACIONES:

Para la prevención del carbón sintomático, edema maligno y pasteurelisis neumónica en bovinos, ovinos y caprinos.

ESPECIES DESTINO:

Bovinos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: Aplique 5 ml por vía subcutánea o intramuscular.

Ovinos y caprinos: Aplique 2.5 ml por vía subcutánea o intramuscular.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Aplíquese a partir de los 3 meses de edad, realice una aplicación de refuerzo a las 3 o 4 semanas. Se recomienda la revacunación cada 6 meses o antes de cualquier manejo que aumente el estrés de los animales.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agítese bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar animales enfermos o animales que puedan ser afectados por enfermedades subclínicas, estrés o inmunodeprimidos

REACCIONES ADVERSAS:

Se pueden presentar reacciones anafilácticas y una ligera reacción inflamatoria transitoria en el sitio de aplicación.

2

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de presentar reacciones anafilácticas se debe administrar epinefrina.

Incompatibilidades:

No se conocen incompatibilidades. No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar.

Protéjase de la luz.

Una vez abierto el frasco, utilice todo el contenido. No emplear el sobrante para aplicaciones posteriores.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 50 ml.

Frascos con 250 ml.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

HECHO EN MÉXICO PARA:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.