

## FICHA TÉCNICA

### NEWHATCH® C2

Reg. B-0273-164

#### USO VETERINARIO



1

#### VACUNA A VIRUS ACTIVO CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

##### FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus activo de la Enfermedad de Newcastle tipo B1 cepa C2  $\geq 10^{5.7}$  DIEP<sub>50</sub>

Vehículo c.b.p. 1 dosis

##### DESCRIPCIÓN:

**NEWHATCH® C2** es una vacuna a virus activo cultivada en embriones de pollo SPF y liofilizada, contiene un título por dosis equivalente a  $\geq 10^{5.7}$  DIEP<sub>50</sub> del virus de la Enfermedad de Newcastle tipo B1 cepa C2. Contiene estabilizadores y sulfato de Gentamicina como conservador.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización de aves de un día de edad o mayores contra la Enfermedad de Newcastle.

##### ESPECIES DESTINO:

Pollita de reemplazo comercial y reproductoras, pollo de engorda y pavos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Esferas liofilizadas.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por aspersión vía ocular o intranasal; cuidando que cada ave reciba al menos el título viral indicado en la fórmula para cada dosis (0.03 ml).

##### *Programa de vacunación:*

Debido a la naturaleza no agresiva de **NEWHATCH® C2** es adecuada para la vacunación inicial de aves sanas de un día de edad o mayores, se recomienda la revacunación después de 2-3 semanas con una vacuna lentogénica contra la Enfermedad de Newcastle (por ejemplo, NOBILIS ND CLONE 30) para incrementar la inmunidad. La efectividad del programa de vacunación a seguir varía en función de la edad, condición corporal y estado inmunológico de las aves a vacunar, así como de las prácticas de manejo técnico de la parvada y del grado de exposición al virus de campo. Tomando en cuenta lo anterior, es muy recomendable establecer un programa de revacunación de acuerdo a las características particulares de cada explotación.

##### CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- No diluya o concentre la dosis de esta vacuna.
- Evite su contaminación.

##### CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

**ADVERTENCIAS:**

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Eviata derramar o salpicar la vacuna ya que el virus de la Enfermedad de Newcastle produce ocasionalmente conjuntivitis al entrar en contacto con los ojos.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Fertilidad y puesta:***

No aplica.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

Se puede combinar con vacunas de Intervet que contengan las cepas de vacuna 4-91, Mass y/o Conn.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

No se presentaron síntomas.

***Incompatibilidades:***

Ninguna conocida.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar entre 2 a 8°C.

Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

**PERIODO DE RETIRO:**

Cero días.

**PRESENTACIONES:**

Charola con 12 contenedores de aluminio con 5,000 dosis cada uno.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los residuos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los residuos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**ELABORADO POR:**

**Intervet International B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.