

FICHA TÉCNICA

BURSA VAC® 3

Reg. SAGARPA B-0273-211

USO VETERINARIO

1

VACUNA LIOFILIZADA CONTRA LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BOLSA DE FABRICIO

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus activo modificado de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio $\geq 10^{2.70}$ EID₅₀

(EIB), cepa IBD 186

Vehículo c.b.p.

1 dosis

DESCRIPCIÓN:

BURSA VAC® 3 vacuna replicada en embriones de pollo SPF; elaborada con la cepa IBD 186; seleccionada por ser altamente antigénica y estimular altos niveles de anticuerpos.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas y como ayuda en la prevención contra la infección de la bolsa de Fabricio o Gumboro, causada por cepas estándar y variantes del virus responsable de esta enfermedad.

ESPECIES DESTINO:

Aves (pollo de engorda y reemplazos).

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración por vía ocular:

Una gota (0.03 ml) por ave. La siguiente tabla puede ser usada como guía para la administración.

Edad de las aves	1,000 Dosis diluidas en:
14 días	5.7 litros de agua
2 – 4 semanas	10 litros de agua
4 – 8 semanas	20 litros de agua
8 semanas o más	40 litros de agua

Preparación de la vacuna:

1. Retire el sello de aluminio y el tapón de caucho del vial de la vacuna.
2. Retire el sello de aluminio y el tapón de caucho del vial del diluyente.
3. Vierta cuidadosamente el diluyente en el vial que contiene la vacuna liofilizada, hasta llenar aproximadamente 2/3 del vial.
4. Coloque nuevamente el tapón de caucho y agite vigorosamente.
5. Vierta la vacuna parcialmente disuelta en el vial que contiene el resto del diluyente.
6. Tape nuevamente el vial del diluyente y agite vigorosamente hasta disolver.

Administración en el agua de bebida:

1. Evite la administración de cualquier medicamento o desinfectante en el agua de bebida, preferentemente 72 horas antes de la vacunación y 24 horas después de la misma.
2. Provea con suficientes bebederos a los animales, de tal manera que al menos 2/3 partes de las aves puedan beber al mismo tiempo.
3. Vierta agua fresca y limpia.
4. No proporcione agua a las aves 2 horas antes de la vacunación a fin de desarrollar sed en las mismas.
5. Rehidrate la vacuna como se indica líneas arriba.
6. Adicionar la vacuna rehidratada en 5.7 litros/1,000 dosis en agua limpia, libre de cloro.
7. Distribuya la vacuna, entre los bebederos provistos para las aves. Evite la exposición directa con los rayos de sol.
8. La vacuna deberá ser la única fuente de hidratación hasta que ésta se haya consumido completamente.

Preparación de la vacuna:

Seguir el mismo procedimiento de preparación para uso por vía ocular y a cambio de utilizar el diluyente se utiliza agua limpia.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Se recomienda vacunar al primer día de edad por vía ocular y en aves de 14 días de edad o mayores por vía oral. Sin embargo, aves que provienen de padres inmunizados deberán ser vacunadas cuando menos hasta los 10 días de edad, para una mejor protección.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Asegúrese que el equipo de vacunación esté limpio.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Las aves a ser vacunadas deben estar libres de todas las enfermedades, incluyendo la forma latente de la enfermedad respiratoria crónica (CRD), coccidiosis clínica, la cabeza negra, infestaciones de parásitos, etc., se tienen que mantener en buenas condiciones ambientales.

REACCIONES ADVERSAS:

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Consulta con tu patólogo aviar para obtener recomendaciones adicionales basadas en las condiciones presentes en tu área.

Se deben realizar grandes esfuerzos para reducir las condiciones de estrés al momento de administrar la vacuna.

Se deben tener los cuidados necesarios para evitar la dispersión del virus de las parvadas vacunadas a instalaciones limpias.

Fertilidad y puesta:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Ninguna diferente a los de dosis única.

Incompatibilidades:

No se conocen.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 a 7°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.

PERIODO DE RETIRO:

No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio de las aves.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 viales de 1,000 dosis cada uno.

Caja con 10 viales de 5,000 dosis cada uno.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

21401 West Center Road,

Elkhorn, Nebraska 68022,

USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

