MSD Salud Animal

PORCINOS

FICHA TÉCNICA

CIRCUMVENT ™PCV

Reg. B-0273-198

USO VETERINARIO

1

VACUNA CONTRA EL CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2

FÓRMULA:

Cada 2 ml contiene:

Antígeno de circovirus tipo 2	≥ 1.2 R.P. *
Vehículo c.b.p.	2 ml

Contiene adyuvante Microsol/Diluvac Forte para estimular una respuesta inmune sólida.
*R.P.= Potencia Relativa

DESCRIPCIÓN:

CIRCUMVENT™ PCV contiene un antígeno inactivado por medio de un sistema vector de baculovirus, el cual expresa el producto génico ORF2 del circovirus porcino tipo 2.

INDICACIONES:

Vacuna subunitaria inactivada lista para usarse como ayuda en la prevención de la viremia y en la prevención de la excreción del virus, causada por el circovirus porcino tipo 2. Contiene el adyuvante Microsol Diluvac Forte ® para una óptima respuesta inmune.

ESPECIES DESTINO:

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión Inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar 2 ml por cerdo vía intramuscular a partir de la tercera semana de edad. Revacunar 3 semanas después conuna dosis igual. El pie de cría debe ser vacunado cada 6 meses.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25 °C).
- Agítese antes de usar.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

Copyright ©2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved. MX-CRV-241100001
MSD SALUD ANIMAL. Intervet México, S.A. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Colonia La Otra Banda, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México

REACCIONES ADVERSAS:
Un aumento transitorio de la temperatura corporal puede ocurrir hasta 2 días después de la vacunación. Algunos lechones quizás pueden deprimirse y pueden mostrar un consumo de alimento reducido por unos días.

ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
Una vez abierto el frasco, utilice todo el contenido.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No se dispone de información sobre el efecto del uso concomitante a esta vacuna con cualquier otro producto, excepto para M+PAC®.
Circumvent ™ PCV se puede utilizar simultáneamente con M+PAC® en cerdos de 3 semanas de edad.
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
Si ocurriera una reacción anafiláctica, el antídoto es epinefrina.
Incompatibilidades:
No se reconocen incompatibilidades.
No se recomienda mezclar con otros medicamentos.
Precauciones de Almacenamiento:
Consérvese entre 2 y 8°C.
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

PERIODO DE RETIRO:
No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

PRESENTACIONES:
Frasco con 100 ml (50 dosis).
Frasco con 200 ml (100 dosis).
Frasco con 500 ml (250 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger e medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:
Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
P.O. Box 318, Millsboro,
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La Otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.

Copyright ©2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved. MX-CRV-241100001
MSD SALUD ANIMAL. Intervet México, S.A. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Colonia La Otra Banda, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.