

## FICHA TÉCNICA

### CIRCUMVENT® C-M-L

Reg. B-0273-304

#### USO VETERINARIO



1

VACUNA DE CIRCOVIRUS PORCINO - TIPO 2, VECTOR BACULOVIRUS INACTIVADO, BACTERINA DE *LAWSONIA INTRACELULARIS* Y *MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE*

#### FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Antígeno de la subunidad ORF2 del circovirus porcino tipo 2

≥1.4 RP \*

*Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado, cepa 11

≥1.2 RP

*Lawsonia intracellularis* inactivado

≥1.5 RP

Excipientes c.b.p.

2 ml

\*Potencia Relativa

Adyuvantes: Microsol®, Fortasol®

Conservadores: Gentamicina y timerosal

#### DESCRIPCIÓN:

Circumvent® CML es una vacuna combinada lista para usar que contiene la subunidad PCV2a, la proteína ORF2 (cápside), *M. hyopneumoniae* y *L. intracellularis*. La vacuna está adyuvantada con un adyuvante patentado.

#### INDICACIONES:

Para la vacunación de cerdos sanos de 3 semanas de edad o más contra la enfermedad causada por el circovirus porcino tipo 2 a y d, la enfermedad respiratoria causada por *M. hyopneumoniae* y la ileítis causada por *L. intracellularis*.

Inicio de la inmunidad:

PCV 2a: 7 semanas después de la vacunación

PCV 2d: 4 semanas después de la vacunación

*M. hyopneumoniae*: 5 semanas después de la vacunación

*L. intracellularis*: 5 semanas después de la vacunación

Duración de la inmunidad:

PCV2d: al menos 16 semanas después de la vacunación. No se ha establecido la duración de la inmunidad para el circovirus porcino tipo 2a.

*M. hyopneumoniae*: al menos 10 semanas después de la vacunación.

*L. intracellularis*: al menos 20 semanas después de la vacunación.

#### ESPECIES DESTINO:

Cerdos.

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

La vacuna debe administrarse a cerdos de 3 semanas de edad o mayores. Para recomendaciones sobre la frecuencia de revacunación, consulte con su Médico Veterinario.

### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

La vacuna es un producto líquido listo para usar. Agite bien. Inmediatamente antes de su uso, lleve la vacuna a temperatura ambiente. Evite la introducción de contaminantes. Reduzca al mínimo el manejo de los cerdos y asegure una ventilación adecuada antes de iniciar la vacunación.

### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

### REACCIONES ADVERSAS:

Un número significativo de cerdos puede experimentar una hinchazón transitoria en el sitio de inyección. La hinchazón debería resolverse sin tratamiento en menos de 29 días. Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado este producto. Si se produce una reacción alérgica, trátela con epinefrina.

### ADVERTENCIAS:

Vacunar únicamente animales sanos.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

### PRECAUCIONES ESPECIALES:

#### ***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Este medicamento de uso veterinario contiene adyuvante oleoso. La inyección accidental/auto inyección puede provocar dolor agudo e inflamación, particularmente si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría resultar en la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica inmediata. Si usted se inyecta accidentalmente con este medicamento veterinario, consulte inmediatamente a un médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, muéstrole el prospecto del empaque. Si el dolor persiste por más de 12 horas después del examen médico, consulte nuevamente a su doctor.

Al médico:

Este medicamento veterinario contiene adyuvante oleoso.

Aun cuando se trate de cantidades pequeñas, la inyección accidental con este producto puede provocar inflamación intensa e incluso resultar en necrosis isquémica, lo que puede ocasionar hasta la pérdida de un dedo. Se requiere la atención INMEDIATA de un médico cirujano especializado ya que puede ser necesario realizar una incisión e irrigación del área afectada, especialmente si están involucrados los tejidos blandos del dedo o el tendón.

#### ***Gestación, lactancia y fertilidad:***

La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia.

#### ***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No se dispone de información sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario debe tomarse caso por caso.

#### ***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

No hay información disponible.

#### ***Incompatibilidades:***

En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

#### ***Precauciones de Almacenamiento:***

Almacene en la oscuridad a 2-8 °C.

No congelar.

Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido.

No utilizar este medicamento de uso veterinario después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

### PERIODO DE RETIRO:

60 días.

**PRESENTACIONES:**

Frascos con 100 ml (50 dosis).

Frascos con 500 ml (250 dosis).

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dicho medicamento veterinario deben eliminarse de acuerdo con la legislación local vigente.

3

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:

**Intervet Inc,**  
DeSoto, KS 35500  
Estados Unidos

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La Otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.