

FICHA TÉCNICA

F VAX MG®

Reg. SAGARPA B-0273-206

USO VETERINARIO

1

VACUNA LIOFILIZADA CONTRA *Mycoplasma gallisepticum*

FÓRMULA:

Cada 10 ml contiene:

Cultivo de <i>Mycoplasma gallisepticum</i> cepa F	5.0 ml (10 ^{6.0} CCU ₅₀ /dosis)
Agente estabilizante NLG + Penicilina	5.0 ml (≤ 30.0 U/ml)

DESCRIPCIÓN:

F VAX MG® contiene cultivos vivos de la cepa F de *Mycoplasma gallisepticum* aislados de aves, en una preparación liofilizada y empacada al vacío.

INDICACIONES:

Para la inmunización y como ayuda en la prevención contra la signología clínica asociada con la infección por *Mycoplasma gallisepticum* indicada en aves de 9 semanas de edad o mayores, aunque es posible aplicarla desde la 5ª semana.

ESPECIES DESTINO:

Aves (gallinas de postura comercial y reproductoras de 9 semanas de edad o mayores).

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración por aspersión:

La aplicación adecuada por rociado se logra solamente usando un rociador limpio que pueda emitir un rociado grueso. Use el método de rociado solamente en establecimientos que puedan mantenerse cerrados durante la vacunación y por lo menos durante los 15 minutos siguientes. Ráfagas, corrientes de aire o ventiladores en funcionamiento pueden impedir la aplicación eficaz de la vacuna.

Después de rehidratar la vacuna, diluya nuevamente cada 1,000 dosis en 100 ml usando el agua con la leche añadida. Pase la vacuna al recipiente rociador. Idealmente las gotas de rociado deben ser gruesas, de un tamaño promedio de 40-50 micrones.

Rocíe la vacuna sobre todas las aves utilizando la medida que proporcione más cantidad de vacuna; ya sea una dosis por pie cuadrado, o una dosis por ave.

Preparación de la vacuna:

1. No abra, ni mezcle la vacuna hasta el momento de su administración.
2. Mezcle sólo un vial a la vez y use todo el contenido durante la hora siguiente.
3. Quite el sello de aluminio del vial de la vacuna sin mover el tapón de caucho.
4. Use agua para beber, limpia, fresca y sin cloro a la que se le ha añadido leche evaporada, en una proporción de una onza de leche por cada cuarto de galón de agua (30 ml por litro).
5. Mantenga el vial sumergido en el agua y levante el borde del tapón de caucho de manera que el agua se absorba dentro del vial.
6. Coloque el tapón de caucho y agite hasta disolver completamente la vacuna. La vacuna ya está lista para ser administrada.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en aves de 9 o más semanas de edad, antes de que se exponga al campo y antes del comienzo de la producción de huevo.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- No diluya la vacuna.
- Vacune únicamente aves sanas.
- Todo el lote de aves debe vacunarse el mismo día. Separe las aves que se han de vacunar de otras aves susceptibles en las mismas instalaciones.

2

CONTRAINDICACIONES:

No administrar una semana antes ni una semana después de la administración de vacunas vivas de Newcastle, bronquitis o laringotraqueítis

No aplicarla 3 días antes y 7 días después de un tratamiento con tetraciclina, clortetraciclina, tiamulina, tilosina o cualquier otro micoplásmico.

REACCIONES ADVERSAS:

Ninguna.

ADVERTENCIAS:

Se conoce que la cepa F de *Mycoplasma gallisepticum* produce enfermedad clínica en pavos. NO PERMITA QUE LOS PAVOS ENTREN EN CONTACTO CON ESTA VACUNA NI CON POLLOS YA VACUNADOS.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

Para evitar interferencia con el desarrollo de la protección, no administrar ningún antibiótico y/o sulfonamida durante 3 días antes ni durante 7 días después.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No utilizar agua medicada ni con desinfectantes hasta 24 horas después que hayan tomado el agua de vacuna.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Ninguna.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 a 7°C.

No congelar.

Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.

PERIODO DE RETIRO:

No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio de las aves.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 viales de 1,000 dosis cada uno.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

3

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

Omaha Nebraska 68103,

USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.