

## FICHA TÉCNICA

### LEPTAVOID™ H

Reg. SAGARPA B-0273-202

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA INACTIVADA CONTRA LA LEPTOSPIROSIS BOVINA

##### FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Cultivos inactivados de *Leptospira interrogans* serovariedad hardjo 204  $\geq 1 \times 10^9$  organismos

Excipiente c.b.p. 1 ml

##### DESCRIPCIÓN:

**Leptavoid™ H** contiene cultivos inactivados de *Leptospira interrogans* serovariedad *hardjo*, como adyuvante sal de aluminio insoluble y timerosal como conservador.

##### INDICACIONES:

Para la vacunación de ganado bovino contra *Leptospira interrogans* serovariedad *hardjo* (*hardjo prajitno*) y *L. borgpetersenii* serovariedad *hardjo* (*hardjo bovis*). Para mejorar la fertilidad del hato cuando se diagnostica infertilidad causada por *L. hardjo*. Estudios de descarga en la conjuntiva demuestran 12 meses de protección cruzada frente a *L. borgpetersenii* serovariedad *hardjo* (*hardjo bovis*).

##### ESPECIES DESTINO:

Bovinos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía subcutánea.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

**Primovacunación:** Administrar dos dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas y máximo de 6 semanas. Preferiblemente el programa deberá completarse en primavera adelantándose a la estación principal de transmisión de Leptospirosis.

**Revacunación:** Se deberá administrar una dosis única cada año con el fin de mantener la protección frente a la infección y reducir progresivamente la exposición del hato.

Si el programa de primovacunación se administra después de la primavera, la primera dosis de refuerzo deberá administrarse durante la primavera siguiente y posteriormente cada año.

##### Vacunación del Ganado Joven:

En caso de que los terneros hayan sido inoculados antes de los 5 meses de edad, se deberá repetir el programa de primovacunación posterior a esta edad, ya que los anticuerpos maternos pudieron haber interferido con la respuesta inmune alcanzada. Los terneros de mayor edad que no se expongan inmediatamente a la infección pueden recibir la primovacunación en cualquier momento, pero se aconseja completar el ciclo justo antes de que comience la estación principal de transmisión de leptospirosis.

##### Aumento de la fertilidad del rebaño:

Para obtener un beneficio máximo se debe complementar la primovacunación dentro de los 12 primeros meses siguientes al diagnóstico de infertilidad a causa de *Leptospira hardjo*.

#### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agite bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles.

#### CONTRAINDICACIONES:

No administrar dentro de las dos semanas anteriores y posteriores al servicio, ya que puede reducirse la tasa de concepción. Esto puede ser debido al estrés del manejo más que a un efecto específico de la vacuna.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Se pueden presentar reacciones de tipo anafiláctico.

#### ADVERTENCIAS:

Contiene timerosal como conservador.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de presentar reacciones anafilácticas se debe usar epinefrina o antihistamínicos.

***Incompatibilidades:***

No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar.

Protéjase de la luz.

#### PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

#### PRESENTACIONES:

Frascos con 50 ml.

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

ELABORADO POR:  
**Burgwedel Biotech GmbH**  
Im Langen Felde 5,  
30938 Burgwedel,  
Alemania.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.