

## FICHA TÉCNICA

### MULTIBACTERINA® 7

Reg. SAGARPA B-0273-138

#### USO VETERINARIO

1

**BACTERINA PARA LA PREVENCIÓN DE PASTEURELOSIS NEUMÓNICA (FIEBRE DE EMBARQUE), CARBÓN SINTOMÁTICO (PIERNA NEGRA), EDEMA MALIGNO, GANGRENA GASEOSA Y HEPATITIS NECRÓTICA INFECCIOSA**

#### FÓRMULA:

Cada ml contiene:

<i>Clostridium chauvoei</i>	3,000 millones de microorganismos
<i>Clostridium septicum</i>	3,000 millones de microorganismos
<i>Clostridium novyi</i>	3,000 millones de microorganismos
<i>Clostridium sordelli</i>	1,100 millones de microorganismos
<i>Pasteurella multocida</i> tipo A	1,100 millones de microorganismos
<i>Pasteurella multocida</i> tipo D	1,100 millones de microorganismos
<i>Mannheimia haemolytica</i>	1,100 millones de microorganismos
Excipiente c.b.p.	1 ml

#### DESCRIPCIÓN:

**Multibacterina® 7** contiene células completas de cultivos inactivados de *Pasteurella multocida* tipos A y D, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* A-1, de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium novyi* y *Clostridium sordelli*, con gel de hidróxido de aluminio como adyuvante.

#### INDICACIONES:

Para la prevención de la pasteurelosis neumónica (fiebre de embarque), del carbón sintomático (pierna negra), el edema maligno, la gangrena gaseosa y la hepatitis necrótica infecciosa.

#### ESPECIES DESTINO:

Bovinos, ovinos y caprinos.

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía subcutánea o intramuscular:

Bovinos: 5 ml

Ovinos y caprinos: 2.5 ml

#### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar a partir de los 3 meses de edad, reforzar a las 3 o 4 semanas. Se recomienda la revacunación cada 6 meses o antes de cualquier manejo que aumente el estrés de los animales.

**CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

- Agite bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles.
- Antes de administrar permita que alcance la temperatura ambiente (15 a 25°C).

2

**CONTRAINDICACIONES:**

No administrar en animales enfermos.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Se pueden presentar reacciones de tipo anafiláctico.

**ADVERTENCIAS:**

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de presentar reacciones anafilácticas se debe usar epinefrina.

***Incompatibilidades:***

No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar.

Protéjase de la luz.

**PERIODO DE RETIRO:**

Cero días.

**PRESENTACIONES:**

Frascos con 50 ml.

Frasco con 250 ml.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

HECHO EN MÉXICO PARA:  
**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.

