

FICHA TÉCNICA

NASALGEN IP

Reg. SAGARPA B-0273-220

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA Y LA PARAINFLUENZA BOVINA TIPO 3

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Virus vivo modificado de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (origen de cultivo Lapine), cepa JS-IBR-BK 54/RK23 potencia mínima $10^{4.2}$ TCID₅₀

Virus vivo modificado de la Parainfluenza Bovina, tipo 3 (origen de línea celular porcina), cepa PI-3-TELC potencia mínima $10^{4.2}$ TCID₅₀

Vehículo c.b.p. 2 ml

DESCRIPCIÓN:

Nasalgen IP contiene virus vivos modificados de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina y de la Parainfluenza Bovina tipo 3.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de bovinos sanos contra la rinotraqueítis viral y la parainfluenza tipo 3.

ESPECIES DESTINO:

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión intranasal.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intranasal en una fosa o 1 ml en cada fosa.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Los animales vacunados antes de 6 meses de edad deberán ser revacunados a los 6 meses o al destete.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agítese bien antes de usar.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Se pueden presentar reacciones anafilácticas posteriores a su aplicación.

ADVERTENCIAS:

Utilice todo el contenido del frasco una vez abierto.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Es seguro para su uso en vacas gestantes o en terneros lactantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se conocen.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Igual que si se tratase de una dosis única (reacciones adversas).

Incompatibilidades:

No se conocen incompatibilidades. No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 7°C.

No congelar.

Utilizar inmediatamente después de su reconstitución.

PERIODO DE RETIRO:

21 días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 20 ml (10 dosis).

Frascos con 100 ml (50 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

ELABORADO POR:

Intervet Inc.
1095 Morris Avenue,
Union New Jersey 07083,
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.