

FICHA TÉCNICA

NEWHATCH® C2

Reg. SAGARPA B-0273-164

USO VETERINARIO

1

VACUNA A VIRUS ACTIVO CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus activo de la Enfermedad de Newcastle tipo B1 cepa C2 $\geq 10^{5.7}$ DIEP₅₀

Vehículo c.b.p. 1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NEWHATCH® C2 es una vacuna a virus activo cultivada en embriones de pollo SPF y liofilizada, contiene un título por dosis equivalente a $\geq 10^{5.7}$ DIEP₅₀ del virus de la Enfermedad de Newcastle tipo B1 cepa C2. Contiene estabilizadores y sulfato de Gentamicina como conservador.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves de un día de edad o mayores contra la Enfermedad de Newcastle.

ESPECIES DESTINO:

Aves (pollitas de reemplazo, reproductoras, gallinas de postura, pollo de engorda y pavos).

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por aspersion vía ocular e intranasal; cuidando que cada ave reciba al menos el título viral indicado en la fórmula para cada dosis (0.03 ml).

Programa de vacunación:

Debido a la naturaleza no agresiva de **NEWHATCH® C2** es adecuada para la vacunación inicial de pollos sanos de un día de edad o mayores, se recomienda la revacunación después de 2-3 semanas con una vacuna lentogénica contra la Enfermedad de Newcastle (por ejemplo NOBILIS ND CLONE 30) para incrementar la inmunidad. La efectividad del programa de vacunación a seguir varía en función de la edad, condición corporal y estado inmunológico de las aves a vacunar, así como de las prácticas de manejo técnico de la parvada y del grado de exposición al virus de campo. Tomando en cuenta lo anterior, es muy recomendable establecer un programa de revacunación de acuerdo a las características particulares de cada explotación.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- No diluya o concentre la dosis de esta vacuna.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Eviatale derramar o salpicar la vacuna ya que el virus de la Enfermedad de Newcastle produce ocasionalmente conjuntivitis al entrar en contacto con los ojos.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Se puede combinar con vacunas de Intervet que contengan cepas de vacuna Mass y/o Conn.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron síntomas.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 viales de 10,000 dosis cada uno.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.