

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® AE+POX

Reg. B-0273-055

USO VETERINARIO



1

VACUNA CONTRA LA ENCEFALOMIELITIS Y VIRUELA AVIAR

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus activo de la Encefalomiélitis aviar, cepa Calnek 1143 $\geq 10^{2.5}$ DIE₅₀

Virus activo de la Viruela aviar, cepa Gibbs $\geq 10^{2.8}$ DIE₅₀

Vehículo c.b.p. 1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® AE+POX es una vacuna bivalente liofilizada a virus activo cultivado en embrión de pollo SPF contra la encefalomiélitis y viruela aviar. Las aves vacunadas están protegidas contra la baja en la postura por estas enfermedades durante la época de postura; la progenie de las aves vacunadas queda protegida contra el virus de la Encefalomiélitis Aviar durante las primeras semanas de vida gracias a la inmunidad transmitida por vía materna.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de pollitas de reemplazo, así como de gallinas y pavos reproductores contra la Viruela Aviar y la Encefalomiélitis Aviar.

ESPECIES DESTINO:

Aves (pollitas de reemplazo, gallinas y pavos reproductores).

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intracutánea por punción en la membrana del ala utilizando el aplicador suministrado.

Preparación de la vacuna:

Reconstituir un vial de la vacuna con el contenido de un vial de diluyente inmediatamente antes de su uso. Insertar el aplicador en la vacuna y luego por punción a la membrana del ala por la parte de abajo. Evitar las áreas de la membrana con plumas.

Después de unos 7 a 10 días de la vacunación, examinar algunas aves a fin de verificar la "asimilación" de la vacuna. Esta "asimilación" es satisfactoria cuando en el lugar de la inoculación se observa una inflamación de piel y la formación de una costra. Las costras suelen caer a las 2 ó 3 semanas después de la vacunación. La inmunización se establece por completo en las 3 semanas posteriores a la vacunación.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Las gallinas deben vacunarse a la edad de 8 a 16 semanas.

Los pavos deben vacunarse a la edad de 18-26 semanas.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- No usar menos de una dosis por ave.
- Todas las aves susceptibles deben vacunarse en un solo manejo.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas. Aunque los signos de la enfermedad no sean evidentes, enfermedades como coccidiosis, infección por *Mycoplasma*, Enfermedad de Marek u otras enfermedades, pueden causar complicaciones serias o reducir el desarrollo de la inmunidad.

No vacunar gallinas de menos de 8 semanas ni pavos de menos de 18 semanas de edad.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No vacunar dentro de las 4 semanas previas al inicio de la postura ni durante el período de postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron síntomas.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 7°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frasco con 1,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.