

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® CAV P4

Reg. SAGARPA B-0273-125

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA INFECCIOSA DE LAS AVES

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus activo atenuado de la Anemia Infecciosa Aviar Cepa 26P4	$\geq 3.0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$
Vehículo c.b.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® CAV P4 es una vacuna liofilizada a virus activo atenuado de la Anemia Infecciosa Aviar cepa 26P4 cultivado en embriones de pollo SPF. Contiene estabilizadores y sulfato de gentamicina como conservador.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves reproductoras y progenitoras para la prevención de la Anemia Infecciosa Aviar, los elevados niveles de anticuerpos maternos previenen la presentación de la enfermedad clínica en la progenie.

ESPECIES DESTINO:

Aves.

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.2 ml por vía subcutánea en el tercio medio del cuello del ave; o vía intramuscular en la pechuga empleando una jeringa estéril y una guja calibre 18 ½ pulgadas de largo; 0.013 ml por punción en la membrana del ala.

Preparación de la vacuna:

Reconstituir la vacuna con el diluyente **Dilavia** de Intervet, a razón de 200 ml de diluyente por cada 1,000 dosis de vacuna para aplicación intramuscular y subcutánea, o con el diluyente **Unisolve** de Intervet a razón de 13 ml por cada 1,000 dosis de vacuna para la aplicación por punción en la membrana del ala.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

El momento y método de administración dependen en gran medida de los problemas observados en la zona, por lo que deberán seleccionarse y realizarse bajo la supervisión de un Médico Veterinario. La vacuna puede utilizarse con seguridad a partir de las 6 semanas de edad. En el caso de las aves reproductoras no deberá excederse esta edad, a fin de que desarrollen un nivel de anticuerpos antes de que inicie la postura.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- No usar menos de una dosis por ave.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No vacunar dentro de las 4 semanas previas al inicio de la postura ni durante el período de postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron síntomas.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

Utilizar la vacuna dentro de las 4 horas posteriores a su reconstitución.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 frascos con 1,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.