



FICHA TÉCNICA

NOBILIS® CORVAC-4

Reg. B-0273-167

USO VETERINARIO

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORIZA INFECCIOSA CAUSADA POR *Avibacterium* paragallinarum

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® CORVAC-4 vacuna de células completas, contiene cepas inactivadas de *Avibacterium paragallinarum* (antes *Haemophilus*) serotipos A, B, C, y una tipo B variante, las cuales estimulan la inmunidad específica contra la Coriza Infecciosa Aviar. Las cepas se incorporan en emulsión de agua en aceite lo cual provee una prolongada estimulación de la inmunidad.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de aves, para reducir la infección y los signos clínicos causados por Avibacterium paragallinarum.

ESPECIES DESTINO:

Aves.

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello en aves de 3 semanas de edad en adelante y se repite la vacunación antes del inicio del periodo de postura.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunar aves de tres semanas de edad en adelante y repetir la vacunación antes del inicio del periodo de postura. El intervalo mínimo entre las vacunaciones deber ser de 6 semanas.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de administrar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
- Agite bien antes de usar.
- No usar menos de una dosis por ave.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

^{*}Dosis protectiva del 70% de las aves.





REACCIONES ADVERSAS:

Las aves pueden mostrarse menos activas en las cinco horas siguientes a la vacunación, pero todas ellas regresan a la normalidad al día siguiente. Durante la semana siguiente a la vacunación, la mayoría de los animales muestran en el sitio de inyección una pequeña inflamación pasajera que desaparece gradualmente.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No vacunar durante el período de postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

NOBILIS® CORVAC-4 puede ser incluida en un programa de vacunación de las aves, que consiste en la vacunación con NOBILIS® IB+ND+EDS v NOBILIS® IB+ND.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se han observado otras reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con una sobredosis, que las ya observadas después de la vacunación con una sola dosis.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

Una vez abierto el envase, utilice el contenido durante las 3 horas subsecuentes.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 frascos con 1,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5830 AA, Boxmeer, Holanda. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Intervet México, S.A. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Colonia La otra Banda, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

2