

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® IB +ND+ EDS INAC

Reg. SAGARPA B-0273-051

USO VETERINARIO

1

VACUNA TRIVALENTE INACTIVADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR, LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y EL SÍNDROME DE BAJA POSTURA

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus inactivado de la Enfermedad de Newcastle, cepa LaSota Clone 30	≥ 50 Unidades PD ₅₀
Virus inactivado de la Bronquitis Infecciosa, tipo Massachusetts, cepa M-41	≥ 10 ^{6.6} DIE ₅₀ (induce ≥ 4 log ₂ UHI)
Virus inactivado del Síndrome de Baja postura, cepa BC-14	1000 UHA
Vehículo c.b.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® IB+ND INAC vacuna trivalente inactivada y emulsionada, contiene la cepa LaSota Clone 30 de la Enfermedad de Newcastle, la cepa M-41 tipo Massachusetts de la Bronquitis Infecciosa y la cepa BC-14 del Síndrome de Baja postura.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la Bronquitis Infecciosa Aviar, la Enfermedad de Newcastle y el Síndrome de Baja Postura.

ESPECIES DESTINO:

Aves (postura y reproductoras).

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión Oleosa.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello del ave o intramuscular en la pechuga, empleando una jeringa estéril y una aguja de calibre 18 mm de ½ pulgada de largo.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en aves de postura comercial y reproductoras entre las 10 y 18 semanas de edad.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- Agite antes de usar.
- Antes de administrar permita que alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

REACCIONES ADVERSAS:

Se puede presentar una ligera inflamación en el sitio de la inyección durante 2 semanas después de la vacunación.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No debe usarse en aves en puesta o dentro de 4 semanas antes del inicio del periodo de colocación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Esta vacuna se puede administrar en el mismo día con (pero no mezclada) NOBILIS TRT.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se ha observado síntomas después de una administración de una dosis doble.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 12 frascos con 1,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.