

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® IB +ND INAC

Reg. SAGARPA B-0273-040

USO VETERINARIO

1

VACUNA INACTIVADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR Y LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus vacunal clonado de la enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30

≥50 PD₅₀ Unidades

Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, cepa M-41, serotipo Massachusetts

≥6 log₂ HI

Vehículo c.b.p.

1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® IB+ND INAC vacuna inactivada y emulsionada, contiene la cepa M 41, tipo Massachusetts del virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar y la cepa LaSota Clone 30 del virus de la enfermedad de Newcastle.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la Bronquitis Infecciosa Aviar y la Enfermedad de Newcastle.

ESPECIES DESTINO:

Aves.

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión Oleosa.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml por vía intramuscular en la pechuga o por vía subcutánea en el tercio medio superior del cuello.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en aves de postura comercial y reproductora entre las 10 y 18 semanas de edad.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- Agite antes de usar.
- Antes de aplicar permita que alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

REACCIONES ADVERSAS:

Se puede presentar una ligera inflamación en el sitio de la inyección durante algunas semanas después de la vacunación.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han encontrado interacciones cuando se administró simultáneamente con otras vacunas inactivadas de Intervet.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Tras la administración de una sobredosis no se presentaron síntomas distintos a los ya mencionados en reacciones adversas.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 12 frascos con 1,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.