

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® MG 6/85

Reg. SAGARPA B-0273-088

USO VETERINARIO

1

VACUNA LIOFILIZADA VIVA, CEPA MG 6/85 DE *Mycoplasma gallisepticum*

FÓRMULA:

Cada dosis de 0.03 ml contiene:

<i>Mycoplasma gallisepticum</i> cepa MG 6/85 (cultivo activo atenuado)	10 ^{7.0} CFU
Excipiente c.b.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® MG 6/85 contiene cultivo activo atenuado de *Mycoplasma gallisepticum* cepa MG 6/85.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la infección por *Mycoplasma gallisepticum*.

ESPECIES DESTINO:

Aves (pollitas de reemplazo, gallina de postura y aves reproductoras).

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por aspersión con gota fina.

Preparación de la vacuna:

NO ABRA O PREPARE LA VACUNA HASTA EL MOMENTO DE COMENZAR LA VACUNACIÓN. UNA VEZ PREPARADA, LA VACUNA DEBERÁ UTILIZARSE INMEDIATAMENTE.

1. Desprenda el sello y quite el tapón del vial que contiene la vacuna.
2. Vierta cuidadosamente agua limpia, fresca, no clorada y de preferencia destilada, en el vial hasta llenarlo a 2/3 de su capacidad.
3. Inserte el tapón y agite vigorosamente hasta que todo el material se disuelva.
4. La vacuna está lista para su aplicación por aspersión, de acuerdo a las siguientes indicaciones.

Aspersión con gota fina. - Para pollitas de 6 a 12 semanas de edad.

1. La vacunación por aspersión deberá ser con gota fina menos o igual a 20 micrones.
2. No use desinfectantes ni leche descremada en el aspersor.
3. Use el aspersor sólo para la administración de las vacunas. Límpielo bien después de cada uso. Se recomienda el uso de Clean Tabs®
4. Apague los ventiladores durante la vacunación. Enciéndalos inmediatamente después de la aspersión. Hay que tener precaución en climas cálidos.
5. Aplique la vacuna caminando lentamente dentro de la caseta.
6. Siga las recomendaciones del fabricante del aspersor sobre el volumen de agua.
7. Use solamente agua limpia, fresca y no clorada (preferentemente destilada).
8. Los operadores deben usar máscara y lentes protectores.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Para desarrollar un programa de vacunación específico para una granja o un complejo avícola, se deben tomar en consideración diversos factores. A fin de lograr una efectividad total, la vacunación debe administrarse correctamente en aves sanas de 6 a 12 semanas de edad, que se encuentren en un ambiente apropiado y bajo buenas condiciones de manejo. Además, la respuesta inmune puede ser influenciada por la edad y el estado inmunológico de los animales. El nivel de inmunidad requerido variará de acuerdo a las prácticas operacionales y el grado de exposición.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- Administre la dosis correcta por ave.
- Vacune todas las aves susceptibles en un mismo local en un solo manejo.
- Evite la medicación de las aves 5 días antes y 5 días después de la vacunación, especialmente con clortetraciclinas, oxitetraciclinas y sulfonamidas.
- Reducir las condiciones de estrés durante la vacunación y post-vacunación.

CONTRAINDICACIONES:

Vacune únicamente aves sanas y libres de *Mycoplasma gallisepticum*.

REACCIONES ADVERSAS:

La vacunación puede inducir una reacción respiratoria transitoria leve que dura unos días, que puede depender de la salud y el estado de las aves.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

La cepa MG 6/85 de *Mycoplasma gallisepticum* no es patógena para pavos, pero se debe tener cuidado en la aplicación de la vacuna, en el manejo de las pollas, así como de la bioseguridad.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Se recomienda el uso de goggles y cubrebocas al momento de aplicar por aspersión la vacuna.

Fertilidad y puesta:

No vacunar dentro de las 4 semanas previas al rompimiento de postura o después del inicio de ésta.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

La vacuna debe ser aplicada dejando un período de 2 semanas entre cualquier vacunación a virus activo contra Newcastle, Bronquitis Infecciosa o Laringotraqueítis.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Tras la administración de una sobredosis no se presentaron síntomas distintos a los ya mencionados en reacciones adversas.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 1,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.