

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® NEWCASTLE BROILER INAC

Reg. SAGARPA B-0273-084

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

FÓRMULA:

Cada 0.1 ml (1 dosis) contiene:

Virus inactivado de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota Clone 30	≥20.0 UDP ₅₀
Excipiente c.b.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® NEWCASTLE BROILER INAC contiene virus inactivado de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota Clone 30, en emulsión de agua y aceite.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la enfermedad de Newcastle.

ESPECIES DESTINO:

Aves.

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.1 ml por ave, vía intramuscular en el muslo o subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en pollo de engorda al día de edad en combinación con vacuna a virus activo de la enfermedad de Newcastle por vía óculo-nasal o por aspersión. En zonas enzoóticas se recomienda la revacunación con virus vivo en agua de bebida.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- Agite antes de usar.
- Antes de administrar permita que alcance la temperatura ambiente.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna, cuando se usa de acuerdo a instrucciones.

REACCIONES ADVERSAS:

En animales sanos sin reacciones clínicas. Se observa ocasionalmente una ligera hinchazón durante algunas semanas después de la vacunación.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Se recomienda el uso de goggles y cubrebocas al momento de aplicar por aspersión la vacuna.

Fertilidad y puesta:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se ha encontrado ninguna interacción cuando se ha administrado simultáneamente con otra vacuna inactivada de Intervet.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Tras la administración de una dosis doble no se presentaron síntomas.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar.

Una vez abierto el envase utilice el contenido en un periodo no mayor a 24 hrs.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 5,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.