



## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® DAPPv+L<sub>4</sub>

Reg. SAGARPA B-0273-268

#### USO VETERINARIO

1

### VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL MOQUILLO (DISTEMPER CANINO), ADENOVIRUS TIPO 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA

#### FÓRMULA:

Cada dosis de 1 ml contiene:

Fracción liofilizada (Virus activos modificados):

Virus del Moquillo Canino, (CDV), cepa Distemperoid	≥10 <sup>3.7</sup> TCID <sub>50</sub>
Adenovirus Canino Tipo 2 (CAV-2), cepa Ditchfield	≥10 <sup>4.8</sup> TCID <sub>50</sub>
Parainfluenza Canina (CPI), cepa CPI-PR	≥10 <sup>4.3</sup> TCID <sub>50</sub>
Parvovirus Canino (CPV), cepa SAH-CPV-2b	≥10 <sup>5.1</sup> FAID <sub>50</sub>

Fracción líquida (inactivada):

<i>Leptospira canicola</i> (LC), Cepa LC-NY	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
<i>Leptospira grippotyphosa</i> (LG)	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> (LI), cepa LI-11403 J	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
<i>Leptospira Pomona</i> (LP)	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>

#### DESCRIPCIÓN:

**Nobivac® DAPPv+L<sub>4</sub>** es la combinación de una vacuna viva modificada liofilizada (Nobivac DAPPv) y una bacterina inactivada líquida (Nobivac L<sub>4</sub>) utilizada como diluyente.

**Nobivac® DAPPv** contiene virus vivos modificados del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2, parainfluenza canina y parvovirus canino.

**Nobivac L<sub>4</sub>** es una bacterina líquida inactivada, contiene *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona* y *L. grippotyphosa*.

#### INDICACIONES:

La vacuna **Nobivac® DAPPv** es una vacuna de virus vivos modificada que es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 1 (hepatitis), virus de la parainfluenza canina, y parvovirus canino.

**Nobivac L<sub>4</sub>** es recomendado para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona* y *L. grippotyphosa*, la prevención de leptospirosis (eliminación de *Leptospira* en orina) causada por *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. grippotyphosa*, y como ayuda en la prevención de leptospirosis causada por *L. pomona*.

#### ESPECIES DESTINO:

Caninos.

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Liofilizado y diluyente.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía subcutánea.



### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

#### Vacunación básica:

La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más. Repetir en intervalos de 2 – 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis es requerido para la inmunización primaria.

#### Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración. No esterilizado químicamente.

Evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

### REACCIONES ADVERSAS:

En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis), fiebre, letargo, edema facial, vómito o diarrea puede ocurrir poco después de la vacunación. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Los datos indican que el desarrollo de opacidad de la córnea no está asociado con el uso de este producto.

### ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

### PRECAUCIONES ESPECIALES:

#### ***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

#### ***Gestación, lactancia y fertilidad:***

No vacunar hembras gestantes.

#### ***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

Ninguna conocida.

#### ***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

Sin signos específicos.

#### ***Incompatibilidades:***

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

#### ***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C.

No congelar.

### PERIODO DE RETIRO:

No aplica.



**PRESENTACIONES:**

Caja con 25 frascos de una dosis.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

3

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:

**Intervet Inc.**

21401 West Center Road,  
Elkhorn, Nebraska 68022,  
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.  
[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)