

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® FELINE 1-HCP+FeLV

Reg. B-0273-301

USO VETERINARIO

1

VACUNA CONTRA LA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA, CALICIVIROSI S FELINA, PANLEUCOPENIA FELINA Y LA LEUCEMIA VIRAL FELINA



FÓRMULA:

Cada dosis (1ml) contiene:

Virus de la Rinotraqueítis felina (FVR), cepa 593-J	$\geq 10^{4.7}$ PFU
Calicivirus felino, (FCV), cepa 894-T	$\geq 10^{3.1}$ PFU
Virus de la Panleucopenia felina (FPL)	$\geq 10^{3.0}$ FAID ₅₀
Virus inactivo de Leucemia felina, aislamiento Rickard	≥ 1.0 RP

Conservadores:

Gentamicina y Anfotericina B

DESCRIPCIÓN:

Vacuna contra la Rinotraqueítis infecciosa, Calicivirosis felina y Panleucopenia felina, una vacuna de virus vivo modificado, combinada con la vacuna contra el virus de la Leucemia felina, una vacuna de virus muerto

INDICACIONES:

Está indicado para la vacunación de gatos sanos a fin de ayudar en la prevención de la enfermedad causada por el virus de la rinotraqueítis, calicivirosis y panleucopenia felina, y ayuda además en la prevención de tumores linfoides causados por la infección por el virus de la leucemia felina (FeLV) y de enfermedades asociadas con esta infección. La vacunación con este producto evita la viremia persistente en gatos expuestos al virus de la leucemia felina virulento.

ESPECIES DESTINO:

Gatos



FORMA FARMACÉUTICA:

Vacuna de virus vivo modificado en la forma de un pellet liofilizado combinado con una vacuna de virus inactivado contra el virus de la Leucemia felina (líquida) como diluyente.

El FeLV ha sido químicamente inactivado y combinado con un adyuvante diseñado para mejorar la respuesta inmunitaria.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea (SC)



Aumentar la temperatura del vial de Nobivac® Feline 2-FeLV) a temperatura ambiente (15°C a 25°C). Agitar el vial de diluyente (Nobivac® Feline 2-FeLV) y transferir el contenido al vial del liofilizado (Nobivac® 1-HCP) de manera aséptica. Mezclar suavemente hasta disolver. Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación.

Administrar una dosis (1 ml) por vía subcutánea a las 9 semanas de edad o más.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Primovacación: Se requieren dos dosis para la inmunización primaria con un intervalo de 3-4 semanas entre cada una. Inyectar la primera dosis (1 ml) por vía SC a las 9 semanas de edad o posterior.

Se sabe que la presencia de anticuerpos maternos interfiere con el desarrollo de la inmunidad activa en los gatos y se requerirá refuerzos adicionales en la mayoría de los gatos cachorros.

Revacunación: Se debe repetir cada dos años con una dosis única de Nobivac® Feline 1-HCP+FeLV. Los estudios indican que los gatos vacunados con Nobivac® Feline 2-FeLV están protegidos contra la viremia persistente del FeLV durante al menos dos años después de la vacunación.

Se recomienda repetir la vacunación con Nobivac® Tricat Trio o Nobivac® 1-HCP en los años intermedios

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración.

Evitar el uso de desinfectantes o alcohol

Hay que asegurar que el liofilizado esté completamente reconstituido antes de usarse.

Antes de la administración, la vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C)

CONTRAINDICACIONES:

Ver Precauciones especiales. Gestación, Lactancia y Reproducción

REACCIONES ADVERSAS:

En casos poco frecuentes, se puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad. Si se produce tal reacción, debe administrarse sin demora epinefrina, corticosteroides y/o antihistamínicos dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Algunos reportes sugieren que, en gatos, la administración de ciertos biológicos veterinarios puede inducir el desarrollo de sarcomas en el sitio de inyección.

ADVERTENCIAS:

Vacunar únicamente animales sanos

La exposición previa a la enfermedad, o la latencia de la enfermedad, son condiciones en las que la vacunación no altera el curso de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas de diagnóstico de todos los

gatos en relación con el antígeno del FeLV antes de la vacunación. Asimismo, la vacunación con este producto no ofrecerá una protección cruzada contra el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV).

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Dado que el producto no ha sido evaluado en gatas preñadas ni durante la lactancia, no se recomienda la vacunación durante la gestación y lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas

Incompatibilidades:

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2 y 8°C, protegido de la luz.

No congelar.

PRESENTACIONES:

Caja con 25 frascos de una dosis que contiene 25 frascos con liofilizado y 25 frascos con diluyente

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dichos medicamentos veterinarios deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



farmacovet@merck.com

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

Omaha, Nebraska 68103

USA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx