



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® TRICAT TRIO

Reg. SAGARPA B-0273-267

USO VETERINARIO

1

VACUNA ACTIVA LIOFILIZADA CONTRA EL CALICIVIRUS FELINO, LA RINOTRAQUEITIS VIRAL FELINA Y PANLEUCOPENIA FELINA.

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Calicivirus felino vivo atenuado, Cepa F9	≥ 4.6 log ₁₀ PFU*
Virus de la rinotraqueítis felina atenuado, Cepa G2620A	≥ 5.2 log ₁₀ PFU*
Virus de la panleucopenia felina vivo atenuado, Cepa MW-1	≥ 4.3 log ₁₀ TCID ₅₀ **
Vehículo c.b.p.	1 dosis

*Unidades de formación de placas

**Dosis infecciosa en cultivo celular

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® Tricat Trio es una vacuna liofilizada, contiene virus activo atenuado contra el Calicivirus felino, la Rinotraqueítis viral felina y la Panleucopenia felina.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de gatos, para reducir los signos clínicos y la excreción de virus provocados por una infección con calicivirus felino y con el virus de la rinotraqueítis felina.

ESPECIES DESTINO:

Felinos domésticos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Para la vacunación básica se deben realizar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 3-4 semanas entre cada una. La primera administración a la edad de 8 a 9 semanas y la segunda administración a la edad de 12 semanas.

Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual.

Preparación de la vacuna:

Reconstituir la vacuna con un vial de Nobivac® Diluyente y permitir que alcance la temperatura ambiente antes de administrarla.



CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
- Utilice material estéril para la administración.
- Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar durante la gestación y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:

Se puede observar una hinchazón ligera y temporal en el sitio de la inyección durante un día. Puede presentarse un ligero y temporal aumento en la temperatura rectal (<40°C), mientras que ocasionalmente se pueden observar ligeras molestias durante el primer día posterior a la vacunación.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No se recomienda la vacunación durante la gestación y lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso concurrente de esta vacuna con cualquier otra. No se recomienda la administración de otras vacunas antes y después de la vacunación con Nobivac® Tricat Trio.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C, protegido de la luz.

No congelar.

Nobivac® Diluyente, puede conservarse a temperatura ambiente.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRESENTACIONES:

Caja con 25 frascos de una dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.



INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.