

FICHA TÉCNICA

PANACUR® SUSPENSIÓN AL 10%

Reg. SAGARPA Q-0273-167

USO VETERINARIO

1

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO EN SUSPENSIÓN ORAL A BASE DE FENBENDAZOL

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Fenbendazol [5-(fenil-tio) bencimidazol- 2 carbamato de metilo] 75 mg

Excipiente c.b.p 1.0 ml

DESCRIPCIÓN:

Panacur® Suspensión al 10% es un antiparasitario de amplio espectro en suspensión para administración oral a base de fenbendazol, tiene eficacia contra huevos, larvas y adultos de nemátodos y cestodos de bovinos; y en perros contra nemátodos, cestodos y giardias.

INDICACIONES:

Bovinos. Indicado en el tratamiento y control efectivo de *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata* y *Oesophagostomum radiatum*.

En caso de parasitosis en oído medio, es necesario el uso de vermífugo de acción sistémica, asociado a un antibiótico para el tratamiento de la otitis.

Perros. Para el tratamiento y control efectivo de *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma brasiliense*, *Toxacara canis* y Giardiasis.

ESPECIES DESTINO:

Bovinos (carne y leche) y perros.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión oral.

PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:

El fenbendazol es un antihelmíntico que pertenece al grupo benzamidazol carbamato; el cual interfiere con el metabolismo energético del nematodo. Ejerce su efecto antihelmíntico tanto en los adultos como en los estados inmaduros de nematodos gastrointestinales y respiratorios. Esta eficacia se basa en la inhibición de la polimerización de la tubulina de los microtúbulos.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

El fenbendazol sólo es absorbido parcialmente por vía oral y se metaboliza en el hígado. La vida media del fenbendazol en el suero después de la aplicación oral de la dosis recomendada es de 10 – 18 horas en el ganado. El fenbendazol y sus metabolitos son distribuidos a lo largo del cuerpo, pero su mayor concentración se encuentra en el hígado. La eliminación del fenbendazol y sus metabolitos ocurren principalmente en las heces (>90%) y en menor medida en la orina, así como en la leche.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía oral con pistola dosificadora, jeringa o como toma directa de la botella.

Bovinos:

5 mg de fenbendazol/kg de peso en DOSIS ÚNICA (equivalente a 1 ml por cada 20 kg de peso).

Contra Oestertagiosis tipo II (larvas hipobióticas) una dosis de 7.5 mg de fenbendazol/kg de peso en DOSIS ÚNICA (equivalente a 1 ml por cada 13 kg de peso).

Para infestaciones con *Moniezia spp* es necesario administrar 10 mg de fenbendazol/kg de peso en DOSIS ÚNICA (equivalente a 1 ml por cada 10 kg de peso)

| Peso | 5 mg de fenbendazol/kg de peso 1 ml/20 Kg de peso |
|--------|--|
| 60 kg | 3.0 ml |
| 80 kg | 4.0 ml |
| 120 kg | 6.0 ml |
| 200 kg | 10.0 ml |
| 400 kg | 20.0 ml |
| 600 kg | 30.0 ml |

Perros:

100 mg de fenbendazol/kg de peso en DOSIS ÚNICA o 50 mg de fenbendazol/kg de peso, por día durante 3 días.

| Peso | Nematodos + Cestodos | Nematodos + <i>Giardia spp.</i> |
|-----------------|---|---|
| | DOSIS ÚNICA 100 mg de fenbendazol/kg de peso | 3 DÍAS 50 mg de fenbendazol/kg de peso |
| Hasta ½ g | 0.5 ml | 0.25 ml |
| De ½ a 1.0 kg | 1.0 ml | 0.50 ml |
| De 1.0 a 1.5 kg | 1.5 ml | 0.75 ml |
| De 1.5 a 2.0 kg | 2.0 ml | 1.00 ml |
| De 2.0 a 2.5 kg | 2.5 ml | 1.25 ml |
| De 2.5 a 3.0 kg | 3.0 ml | 1.50 ml |

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

No posee.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Se puede administrar en cualquier etapa de la gestación y lactación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se especifica acción.

Incompatibilidades:

Ninguna.

Precauciones de Almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco y seco.

PERIODO DE RETIRO:

El ganado productor de carne no deberá ser sacrificado dentro de los 11 últimos días de tratamiento.

La leche no deberá ser utilizada para consumo humano, ni animal hasta 5 días después del último tratamiento.

PRESENTACIONES:

Frasco con 100 ml.

Frasco con 1 L.

Frasco con 5 L.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

ELABORADO POR:

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.

Bento Soares, 530, Itagaçaba,

12730-340, Cruzeiro /SP,

Brasil.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.