

FICHA TÉCNICA

PORCILIS COLICLOS[®]

Reg. SAGARPA B-0273-263

USO VETERINARIO

1

VACUNA CONTRA LA ENTEROTOXICOSIS NEONATAL Y LA ENTERITIS NEONATAL NECRÓTICA EN PORCINOS.

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Componentes de *E. coli*:

- Adhesina fimbrial F4ab	≥ 9.3 log ₂ título Ab ¹
- Adhesina fimbrial F4ac	≥ 6.5 log ₂ título Ab ¹
- Adhesina fimbrial F5	≥ 7.5 log ₂ título Ab ¹
- Adhesina fimbrial F6	≥ 7.4 log ₂ título Ab ¹
- Toxoide LT	≥ 10.5 log ₂ título Ab ¹

Componente de *Clostridium perfringens*:

- Antígeno tipo C	≥ 20 UI
-------------------	---------

¹Título medio de anticuerpos (Ab) obtenido tras la vacunación de ratones.

Adyuvante:

- Acetato de dl- α -tocoferilo	150 mg
---------------------------------------	--------

Vehículo c.b.p.

2 ml

DESCRIPCIÓN:

Porcilis Coliclos[®] estimula la inmunidad activa con el fin de proporcionar inmunidad pasiva a la progenie frente a la enterotoxiosis neonatal, provocada por cepas de *E. coli* que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88 ac), F5 (K99), F6 (987p) y/o que producen el toxoide LT y contra la enteritis necrótica provocada por *C. perfringens* tipo C. En condiciones de campo se observa un efecto positivo frente a infecciones provocadas por *C. perfringens* tipo A.

INDICACIONES:

Para la inmunización pasiva por calostro de la progenie mediante la inmunización activa de cerdas adultas y nulíparas con el fin de reducir la mortalidad y los signos clínicos durante los primeros días de vida, causados por cepas de *E. coli* y provocadas por *C. perfringens* tipo C. En condiciones de campo se observa un efecto positivo contra infecciones provocadas por *C. perfringens* tipo A.

ESPECIES DESTINO:

Cerdas (adultas y nulíparas).

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión Inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular, detrás de la oreja en el cuello.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunación básica:	En cerdas adultas/nulípara que no han sido vacunadas con el producto, se debe administrar una primera inyección de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista para el parto, seguida de una inyección de refuerzo 4 semanas más tarde.
Revacunación:	Se administra una sola revacunación de 2 a 4 semanas antes de la fecha prevista para el parto.

2

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
- Agite antes de usar y durante la vacunación.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

REACCIONES ADVERSAS:

Tras la vacunación puede observarse un aumento transitorio de la temperatura corporal y una inflamación temporal en el sitio de inyección.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Puede administrarse en hembras gestantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos medicinales de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario debe tomarse basándose en cada uno de los casos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Igual que si se tratase de una dosis única (reacciones adversas).

Incompatibilidades:

No se reconocen incompatibilidades.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 50 ml (25 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

3

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

29160 Intervet Lane,
P.O. Box 318, Millsboro,
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.