

FICHA TÉCNICA

PORCILIS[®] ILEITIS

Reg. SAGARPA B-0273-282

USO VETERINARIO



1

BACTERINA PARA EL CONTROL DE LA ILEITIS CAUSADA POR *Lawsonia intracellulularis* EN CERDOS.

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Cultivos inactivados de *Lawsonia intracellulularis*, SPAH08

1.2 RP*

Vehículo c.b.p.

2 ml

*Potencia Relativa

DESCRIPCIÓN:

Porcilis[®] Ileitis es una bacterina inactivada contra la enteritis proliferativa porcina. La vacuna contiene células inactivadas de *L. intracellulularis* en un adyuvante de aceite en agua. Las células bacterianas de *L. intracellulularis* utilizadas para la fabricación de **Porcilis[®] Ileitis** se producen mediante un co-cultivo de la cepa de producción de *L. intracellulularis* en una línea celular McCoy. Una vez cultivadas las células McCoy son concentradas, sometidas a sonificación e inactivadas con etilenimina binaria. El antígeno es adyuvantado para producir la vacuna final.

INDICACIONES:

Para la administración en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores, para controlar la ileítis, reducir la colonización, así como para disminuir la duración de la excreción fecal provocada por *Lawsonia intracellulularis*. Se ha demostrado que la duración de la inmunidad es de por lo menos 20 semanas.

ESPECIES DESTINO:

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

La vacuna debe administrarse a cerdos de 3 semanas de edad o mayores.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
- Agite bien antes de usar y durante la vacunación.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

REACCIONES ADVERSAS:

Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado el producto. Es conveniente disminuir al máximo la manipulación de los cerdos y asegurarse de que la ventilación sea adecuada antes de iniciar la vacunación. Un número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal en la zona inyectada. Esta inflamación debe remitir sin tratamiento alguno en menos de 20 días. Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina.

2

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes del cuerpo. Una inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato.

Gestación, lactancia y fertilidad:

La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos medicinales de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario debe tomarse basándose en cada uno de los casos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No existe diferencia alguna con la administración de una dosis sencilla (ver reacciones adversas).

Incompatibilidades:

No se reconocen incompatibilidades.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 7°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido.

PERIODO DE RETIRO:

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

PRESENTACIONES:

Frasco con 100 ml (50 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

Omaha NE 68103,

USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La Otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.