

## FICHA TÉCNICA

### QUANTUM® DA2PPv+Cv

Reg. SAGARPA B-0273-286

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER, ADENOVIRUS TIPO 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS CANINO Y CORONAVIRUS CANINO



#### FÓRMULA:

##### Cada dosis contiene:

##### Fracción liofilizada:

Virus vivo modificado de Moquillo canino, cepa Distemperoide

$10^{3.7}$  TCID<sub>50</sub>\*

Virus vivo modificado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield

$10^{4.8}$  TCID<sub>50</sub>\*

Virus vivo modificado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR

$10^{4.3}$  TCID<sub>50</sub>\*

Virus vivo modificado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b

$10^{5.1}$  TCID<sub>50</sub>\*

\*Dosis infecciosa de cultivo tisular 50%

##### Fracción líquida:

Virus inactivado de Coronavirus

1.0 RP\*\*

\*\*Potencia relativa

##### Conservador:

Gentamicina

#### DESCRIPCIÓN:

Protección contra todas las variantes conocidas de Parvovirus canino, contra 2 tipos de Adenovirus causantes de Hepatitis infecciosa y enfermedad respiratoria en perros, contra Distemper canino, Parainfluenza y Coronavirus canino

#### INDICACIONES:

Para la inmunización de caninos sanos de seis o más semanas de edad como ayuda en la prevención y control del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus canino y Coronavirus canino.

#### ESPECIES DESTINO:

Perro



#### FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada + Suspensión inyectable

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea o intramuscular



Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular

2

## PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

**Primovacunación:** deberá realizarse en cachorros de seis o más semanas de edad, repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis son requeridas.

### Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual con una dosis

## CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración

Agitar el contenido del frasco de Quantum® CV y transferirlo asépticamente al frasco de Quantum® DA2PPv. Mezclar suavemente hasta la completa disolución. Usar inmediatamente todo el contenido luego de la reconstitución

Antes de la administración, la vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C).

## CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

## REACCIONES ADVERSAS:

Puede producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación. Utilizar epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo con la naturaleza y severidad de la reacción

## ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

La edad a la que los anticuerpos maternos para parvovirus canino ya no interfieren con el desarrollo de la inmunidad activa varía entre los cachorros

## PRECAUCIONES ESPECIALES:

### Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto

### Gestación, lactancia y fertilidad:

No vacunar hembras gestantes

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

Ninguna conocida

**Sobredosis (signos, procedimientos de emergencia y antídotos):**

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas

**Incompatibilidades:**

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

**Precauciones de Almacenamiento:**

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C.

No congelar

**PRESENTACIONES:**

Caja con 25 frascos de una dosis que contiene 25 frascos con liofilizado y 25 frascos con diluyente

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dichos medicamentos veterinarios deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



[farmacovet@merck.com](mailto:farmacovet@merck.com)

**ELABORADO POR:**

**Intervet Inc.**

10488 South 136th Street,  
Omaha Nebraska 68138,  
USA.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México**

Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.

[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)