



FICHA TÉCNICA

QUANTUM® DA2PPvL

Reg. SAGARPA B-0273-288

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER, ADENOVIRUS TIPO 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus activos modificados contra:

Moquillo canino, cepa Distemperoide	10 ^{3.7} TCID ₅₀
Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield	10 ^{4.8} TCID ₅₀
Parainfluenza canina, cepa CPI-PR	10 ^{4.3} TCID ₅₀
Parvovirus canino, cepa SAH-CPv 2b	10 ^{5.1} TCID ₅₀
Bacterina contra <i>Leptospira canicola</i> , cepa LC-NY	0.0300 ml
Bacterina contra <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , cepa LI11 403J	0.0220 ml
Vehículo c.b.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

Quantum® DA2PPvL es una vacuna combinada, contiene virus virus vivo modificado del Distemper, Adenovirus Tipo 2, virus de la Parainfluenza y Parvovirus canino, también contiene bacterina inactivada de *Leptospira interrogans* serovares canicola e icterohaemorrhagiae.

INDICACIONES:

Para la inmunización de caninos sanos de seis semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención y control del Distemper, Adenovirus tipo 2, Parainfluenza y Leptospirosis canina.

ESPECIES DESTINO:

Caninos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

La primovacunación deberá realizarse en cachorros de seis semanas de edad o mayores, repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas o tres meses de edad.

Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

Preparación de la vacuna:

Agitar el contenido del frasco del diluyente y transferirlo asépticamente al frasco de **Quantum® DA2PPvL**. Mezclar suavemente hasta la completa disolución. Usar inmediatamente todo el contenido luego de la reconstitución.



CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
- Utilice material estéril para la administración.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar hembras gestantes.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación, utilizar como antídotos epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo a la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos, sin síntomas clínicos de enfermedad y desparasitados.

Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No vacunar hembras gestantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRESENTACIONES:

Caja con 25 frascos de una dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.



ANIMALES DE COMPAÑÍA



ELABORADO POR:
Intervet Inc.
Omaha Nebraska 68103,
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.

