

FICHA TÉCNICA

QUANTUM® DA2PPvL+Cv

Reg. SAGARPA B-0273-287

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER, ADENOVIRUS TIPO 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS CANINO, LEPTOSPIROSIS Y CORONAVIRUS CANINO



FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Fracción liofilizada:

Virus vivo modificado de Moquillo canino, cepa Distemperoide

$10^{3.7}$ TCID₅₀*

Virus vivo modificado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield

$10^{4.8}$ TCID₅₀*

Virus vivo modificado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR

$10^{4.3}$ TCID₅₀*

Virus vivo modificado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b

$10^{5.1}$ TCID₅₀*

Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Canicola, cepa LC-NY

0.0300 ml

Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Icterohaemorrhagiae, cepa LI11 403J

0.0220 ml

*Dosis infecciosa de cultivo tisular 50%

Fracción líquida:

Virus inactivado de Coronavirus

1.0 RP**

**Potencia relativa

Conservadores:

Gentamicina y Timerosal

DESCRIPCIÓN:

Protección contra todas las variantes conocidas de Parvovirus canino, contra 2 tipos de Adenovirus causantes de Hepatitis infecciosa y enfermedad respiratoria en perros, contra Distemper canino, Parainfluenza, Coronavirus canino y contra 2 serovariedades de *Leptospira*: Canicola e Icterohaemorrhagiae

INDICACIONES:

Para la inmunización de caninos sanos de seis o más semanas de edad como ayuda en la prevención y control del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus canino, Coronavirus canino y Leptospirosis.

ESPECIES DESTINO:

Perro



2

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada + Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea o intramuscular



Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Primovacunación: deberá realizarse en cachorros de seis o más semanas de edad, repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis son requeridas.

Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual con una dosis

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración

Agitar el contenido del frasco de Quantum® CV y transferirlo asépticamente al frasco de Quantum® DA2PPvL. Mezclar suavemente hasta la completa disolución. Usar inmediatamente todo el contenido luego de la reconstitución

Antes de la administración, la vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C).

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación. Utilizar epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo con la naturaleza y severidad de la reacción

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

La edad a la que los anticuerpos maternos para parvovirus canino ya no interfieren con el desarrollo de la inmunidad activa varía entre los cachorros

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto

Gestación, lactancia y fertilidad:

No vacunar hembras gestantes

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C.

No congelar

PRESENTACIONES:

Caja con 25 frascos de una dosis que contiene 25 frascos con liofilizado y 25 frascos con diluyente

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dichos medicamentos veterinarios deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



farmacovet@merck.com

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

10488 South 136th Street,
Omaha Nebraska 68138,
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México

Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx