

## FICHA TÉCNICA

### QUANTUM® DAPP<sub>v</sub>+L4

Reg. SAGARPA B-0273-296

#### USO VETERINARIO

1

### VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER, ADENOVIRUS TIPO 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS CANINO Y LEPTOSPIROSIS CANINA



#### FÓRMULA:

##### Cada dosis contiene:

##### Fracción liofilizada:

Virus vivo modificado de Moquillo canino, cepa Distemperoide

 $\geq 10^{3.7}$  TCID<sub>50</sub>\*

Virus vivo modificado de Adenovirus tipo 2, cepa Ditchfield

 $\geq 10^{4.8}$  TCID<sub>50</sub>\*

Virus vivo modificado de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR

 $\geq 10^{4.3}$  TCID<sub>50</sub>\*

Virus vivo modificado de Parvovirus canino, cepa SAH CPV-2b

 $\geq 10^{5.1}$  TCID<sub>50</sub>\*

 Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Canicola, cepa LC-NY

 $\geq 80$  hamster PD80

 Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Icterohaemorrhagiae, cepa LI11 403J

 $\geq 80$  hamster PD80

 Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar Pomona

 $\geq 80$  hamster PD80

 Bacterina de *Leptospira kirschneri* serovar Grippotyphosa

 $\geq 80$  hamster PD80

\*Dosis infecciosa de cultivo tisular 50%

##### Conservadores:

Anfotericina B

#### DESCRIPCIÓN:

Protección contra todas las variantes conocidas de Parvovirus canino, contra 2 tipos de Adenovirus causantes de Hepatitis infecciosa y enfermedad respiratoria en perros, contra Distemper canino, Parainfluenza, y para prevenir la mortalidad y la leptospiuria ocasionada por 4 serovariedades de *Leptospira*: Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa y Pomona.

#### INDICACIONES:

Para la inmunización de caninos sanos de seis o más semanas de edad como ayuda en la prevención y control del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus canino y Leptospirosis.

#### ESPECIES DESTINO:

Perro



### FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada + Suspensión inyectable

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea o intramuscular



Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular

### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

**Primovacunación:** deberá realizarse en cachorros de ocho más semanas de edad, repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis son requeridas.

#### Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual con una dosis

### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración

Agitar el contenido del frasco de Quantum® L4 y transferirlo al frasco de Quantum® DAPPv. Mezclar suavemente hasta la completa disolución. Usar inmediatamente todo el contenido luego de la reconstitución. Antes de la administración, la vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C).

### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

### REACCIONES ADVERSAS:

Raros (1 a 10 animales por cada 10,000 animales tratados) reacciones de hipersensibilidad, fiebre, letargia, edema facial, vómito o diarrea que puede ocurrir poco después de la vacunación

En caso de reacción anafiláctica utilizar epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo con la naturaleza y severidad de la reacción

### ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

La edad a la que los anticuerpos maternos para parvovirus canino ya no interfieren con el desarrollo de la inmunidad activa varía entre los cachorros.

### PRECAUCIONES ESPECIALES:

#### Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto

**Gestación, lactancia y fertilidad:**

No vacunar hembras gestantes

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

Ninguna conocida

**Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):**

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas

**Incompatibilidades:**

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

**Precauciones de Almacenamiento:**

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C.

No congelar

**PRESENTACIONES:**

Caja con 25 frascos de una dosis que contiene 25 frascos con liofilizado y 25 frascos con diluyente

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dichos medicamentos veterinarios deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



[farmacovet@merck.com](mailto:farmacovet@merck.com)

**ELABORADO POR:**

**Intervet Inc.**

10488 South 136th Street,  
Omaha Nebraska 68138,  
USA.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México**

Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.

[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)