



FICHA TÉCNICA

VIVITONIN® P 50

Reg. SAGARPA Q-0273-148

USO VETERINARIO

1

PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

FÓRMULA:

Cada tableta de 105 mg contiene:

3-metil 1 (5 oxohexil) – 7 – propil xantina (Propentofilina)	2.5 mg
Excipientes c.b.p	1 tableta (105 mg)

DESCRIPCIÓN:

Vivitonin® 50 es un vasoterapéutico en tabletas recubiertas para administración oral, mejora la irrigación sanguínea periférica y el suministro de oxígeno en el cerebro, así como en la musculatura cardíaca y esquelética.

INDICACIONES:

Es un vasoterapéutico el cual favorece la vasodilatación central y periférica. En varias investigaciones, se ha demostrado que la propentofilina aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, el corazón y los músculos. Inhibe la agregación plaquetaria y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos.

ESPECIES DESTINO:

Caninos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Tabletas recubiertas.

PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:

La Propentofilina pertenece a los derivados de xantina. En diversas investigaciones en especies animales se pudo demostrar que la propentofilina aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, el corazón y el músculo esquelético. Inhibe la agregación de plaquetas y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

Después de la aplicación oral de **VIVITONIN® 50** es rápida y completamente absorbido y distribuido en los tejidos. Administrado por vía oral a perros los niveles plasmáticos máximos se alcanzaron a los 15 minutos.

El tiempo medio es de unos 30 minutos y la biodisponibilidad de las cantidades de sustancia madre es aproximadamente 30%. Hay una serie de metabolitos eficaces y la biotransformación se lleva a cabo principalmente en el hígado. Propentofilina se excreta en forma de sus metabolitos en un 80 - 90% por vía renal. El resto se elimina en heces. No hay acumulación.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se administra por vía oral. Puede administrarse directamente o escondido en un bocado o fragmentado y mezclado con el alimento. La dosis básica es de 3 mg/Kg de peso. Siempre y cuando no se prescriba de otra forma, las siguientes dosis se pueden administrar dos veces al día:

Peso	Cantidad
2 – 4 Kg	¼ tableta
5 – 8 Kg	½ tableta
9 – 15 Kg	1 tableta
16 – 25 Kg	1 ½ tabletas
26 – 33 Kg	2 tabletas
34 – 50 Kg	3 tabletas

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caninos para reproducción.

REACCIONES ADVERSAS:

En algunos pocos casos puede provocar reacciones alérgicas (por ejemplo, urticaria). En estos casos es necesario suspender el tratamiento.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

Ninguna. En caso de observar algún efecto adverso debido a la administración del medicamento, que no se mencione en este instructivo, favor de indicárselo al Médico Veterinario.

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No administrar en hembras gestantes.

No utilizar en especies de producción.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Debido a la buena tolerabilidad del producto no hay síntomas de sobredosis.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente, no superior a 25°C.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRESENTACIONES:

Caja con 60 tabletas.



PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

3

ELABORADO POR:

Intervet GmbH

Siemensstrasse 107

1210 Wien

Austria

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.