

## FICHA TÉCNICA

### NOBILIS® EDS 76 INAC

Reg. SAGARPA B-0273-033

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE BAJA POSTURA

##### FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Adenovirus inactivado Cepa BC-14

1000 unidades hemoaglutinante

Vehículo c.b.p.

1 dosis

##### DESCRIPCIÓN:

**NOBILIS® EDS 76 INAC** contiene el virus inactivado del Síndrome de Baja Postura Cepa BC14, inactivado y suspendido en emulsión oleosa.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra el síndrome de Baja Postura.

##### ESPECIES DESTINO:

Aves.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml por vía subcutánea en el tercio medio superior del cuello o por vía intramuscular en la pechuga.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

En aves de postura comercial y en reproductoras vacunar entre las 10 y 18 semanas de edad.

##### CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de administrar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
- No usar menos de una dosis por ave.
- Evite su contaminación.

##### CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

##### REACCIONES ADVERSAS:

En las aves sanas no se observó ninguna reacción clínica en la vacunación. Se puede observar una pequeña inflamación transitoria en el lugar de la inyección.

**ADVERTENCIAS:**

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.  
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Fertilidad y puesta:***

No vacunar al inicio de la postura ni durante el período de postura.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

Ninguna conocida.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

No se presentaron síntomas.

***Incompatibilidades:***

Ninguna conocida.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar.

**PERIODO DE RETIRO:**

Cero días.

**PRESENTACIONES:**

Caja con 12 frascos de 1,000 dosis cada uno.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**ELABORADO POR:**

**Intervet International B.V.**  
Wim de Körverstraat 35,  
5830 AA, Boxmeer,  
Holanda.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.