

intervet

*marca la
diferencia*



*La penicilina combinada
lista para usarse*

Depomycine 20/20



L I N E A G A N A D E R A


Depomycine® 20/20

Es una combinación de Penicilina Procaínica y Sulfato de Dihidroestreptomicina.

La penicilina es activa contra las bacterias Gram-positivas y algunas Gram-negativas como Pasteurella multocida.

La estreptomicina en combinación con la penicilina aumenta el espectro de acción, incluyendo a las bacterias gram-negativas como E. coli, P. haemolytica.

Los patrones de distribución de ambos antibióticos hacen que sea una combinación muy especial, de gran utilidad en el tratamiento de NEUMONIAS y otras INFECCIONES.



CMI datos

Penicilina / Estreptomicina

Organismo	mcg/ ml
Staph. spp	0.06
Strep. spp	0.03
C. pyogenes	0.03
P. multocida	0.13
Salmonella spp	16.0
E. coli	8.16

CARACTERISTICAS

- Amplio espectro y efecto sinérgico.
- Amplia distribución en los tejidos.
- Corto período de retiro en leche (36 hrs).
- Menor volumen de aplicación.
- Consistencia no viscosa y listo para aplicar.

BENEFICIOS

- Efectivo cuando el agente causal no ha sido identificado en infecciones mixtas.
- Rápida recuperación de los animales tratados.
- Efectivo en el tratamiento de infecciones de diferentes órganos.
- Menos pérdidas por desecho de leche.
- Menor estrés por manejo.
- Fácil de aplicar y más práctico.

Composición:

Cada ml contiene
 Penicilina Procaínica 200,000 U.I.
 Sulfato de dihidroestreptomicina 200 mg
 Excipiente c.b.p. 1 ml

Período de retiro:

Carne: 14 días
 Leche: 48 horas

Presentación:

Frascos de 100 y 250 ml

Descripción:

Suspensión antibiótica de amplio espectro acuosa inyectable.

Indicaciones:

Para el tratamiento de Rumiantes de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la combinación de penicilina y estreptomicina, como el caso de infecciones urogenitales, del tracto respiratorio, mastitis, metritis, artritis e infecciones de la piel.

Dosis y vía de administración:

Bovinos, Equinos, Ovinos y Caprinos 1 ml/20 Kg de peso, por vía intramuscular.



Reg. SAGARPA Q-0273-097



La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México, Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com.mx Oficinas Interlomas, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536



200303 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional