

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® REO 2177

Reg. SAGARPA B-0273-170

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES CONTRA LA ARTRITIS VIRAL O TENOSINOVITIS AVIAR

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Reovirus Aviar activo vepa 2177

$\geq 3.1 \log_{10} \text{TCID}_{50}$

Vehículo c.b.p.

1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® REO 2177 es una vacuna liofilizada que contiene Reovirus aviar cepa 2177, no patogénica.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de pollos sanos para reducir Tenosinovitis y síntomas asociados a la enfermedad debidos a la infección por Reovirus. La vacuna puede administrarse desde 1 día de edad y es eficaz en la presencia de anticuerpos maternos. La vacuna es eficaz para sensibilizar a vacunas inactivadas de Reovirus.

ESPECIES DESTINO:

Aves (Pollo de engorda, y gallinas de reemplazo).

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.2 ml por ave, por vía intramuscular (músculos del muslo o pechuga; o subcutánea en la base del cuello).

Preparación de la vacuna:

Reconstituir el liofilizado en el diluyente para vacunas de la enfermedad de Marek.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en pollo de engorda y de reemplazo sanos de un día de edad, en aves de reemplazo de progenitores y reproductores, es necesario revacunar a las 10 o 12 semanas con virus inactivados.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- Agite antes de usar.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna, cuando se usa de acuerdo a las instrucciones.

REACCIONES ADVERSAS:

No se han observado efectos adversos sistémicos o locales después de la vacunación.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente aves sanas.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No administrar durante el periodo de postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Puede ser administrada simultáneamente con la vacuna contra la enfermedad de Marek de Intervet en aves de 1 día de edad.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se observan síntomas tras la administración de una sobredosis de la vacuna.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario (excepto el diluyente suministrado para su uso con el producto).

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar, ni exponer a la luz solar.

Una vez abierto el envase, utilice todo el contenido.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 frascos con 10,000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.