

FICHA TÉCNICA

PORCILIS[®] AR-T DF

Reg. SAGARPA B-0273-254

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE HEMBRAS REPRODUCTORAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA RINITIS ATRÓFICA EN CERDOS.

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Toxina dermonecrótica de *Pasteurella multocida* como toxoide (Proteína d0 45 $\geq 6.2 \log_2$ TN¹ unidades por dosis/cerdas).

Células inactivadas de *Bordetella bronchiseptica*, cepa No. 92932 (Concentrado bacteriano 45 mg por dosis/cerda) $\geq 4.2 \log_2$ Agutl²

Vehículo c.b.p. 2 ml

¹Título promedio de neutralización de la toxina obtenido después de la vacunación repetida con media dosis en conejos.

²Título promedio de aglutinación obtenido después de una vacunación repetida con media dosis en conejos.

DESCRIPCIÓN:

PORCILIS[®] AR-T DF es una vacuna inactivada para la prevención de la rinitis atrófica en los cerdos que contiene un toxoide obtenido a partir de una cepa de *Pasteurella multocida* tipo D toxigénica, más una cepa de *Bordetella bronchiseptica*, seleccionada por su capacidad patogénica e inmunogénica en los lechones. Esta vacuna está emulsionada en un adyuvante oleoso (Diluvac[®] Forte).

INDICACIONES:

Para la inmunización de hembras reproductoras con el objetivo de proteger a los lechones mediante los anticuerpos de origen materno contra la rinitis atrófica.

ESPECIES DESTINO:

Porcinos (cerdas reproductoras y reemplazo).

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular profunda detrás de la oreja.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunación básica:

En granjas sin antecedentes de vacunación, vacunar 2 veces a todo el pie de cría con un intervalo de 6 semanas entre cada vacunación. Estos animales no requerirán de revacunación durante 3 meses, posteriormente se incorporarán al programa de pie de cría de la granja. Este programa debe aplicarse también a los animales de reemplazo.

Vacunación al pie de cría:

Las hembras de pie de cría deben vacunarse entre las 4 y 3 semanas antes de cada parto.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
- Agítese bien antes de usar y durante la vacunación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

2

REACCIONES ADVERSAS:

Un incremento transitorio de la temperatura corporal de 1.5°C, o en algunos cerdos hasta 2.5°C que generalmente disminuye el día de la vacunación o al día siguiente. También de un 10-20% de los animales pueden presentar una disminución en la actividad y ausencia del apetito al día de vacunación y/o una inflamación transitoria (máximo 10 cm de diámetro) hasta por dos semanas en el sitio de aplicación.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

El riesgo de aborto es nulo y en cualquier caso es menos que con cualquier otra vacunación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario, se debe revisar caso por caso.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Aparte de un leve incremento de la temperatura el día de la vacunación o un día después, no se presentan más reacciones adversas que las ya mencionadas.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 50 ml (25 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

3

ELABORADO POR:
Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
P.O. Box 318, Millsboro,
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.