

FICHA TÉCNICA

BACTERINA MIXTA PORCINA

Reg. SAGARPA B-0273-133

USO VETERINARIO

1

BACTERINA CONTRA PASTEURELOSIS, COLIBACILOSIS Y SALMONELOSIS EN PORCINOS

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

<i>Pasteurella multocida</i> tipos A y D	2,500 millones de gérmenes
<i>Escherichia coli</i>	1,250 millones de gérmenes
<i>Salmonella choleraesuis</i>	1,250 millones de gérmenes
Vehículo c.b.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN:

Cultivo total de cepas de *Pasteurella multocida* serotipos A y D, *Escherichia coli* y *Salmonella choleraesuis* inactivados químicamente y adsorbidos en hidróxido de aluminio para inducir una mayor respuesta inmunológica.

INDICACIONES:

Bacterina para la prevención de la Pasteurelosis, Salmonelosis y Colibacilosis en porcinos.

ESPECIES DESTINO:

Porcinos (Reproducción y engorda).

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía subcutánea o intramuscular.

Lechones recién destetados: 3 ml.

Cerdos en crecimiento o adultos: 5 ml.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

En cerdos que no han recibido ninguna dosis se recomiendan dos aplicaciones con un intervalo de 2-3 semanas.

En pie de cría, la revacunación debe realizarse cada 6-8 semanas. Las hembras gestantes deben vacunarse 3 semanas antes del parto.

Los lechones se vacunan después del destete, con una segunda dosis 2-3 semanas posteriores. Se recomienda aplicar una dosis tres semanas antes de que se transporten animales a grandes distancias.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Utilice siempre jeringas y agujas estériles.

Agite antes de usar.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune animales enfermos o debilitados, con condición corporal pobre o parasitados.

REACCIONES ADVERSAS:

De ocurrir una reacción anafiláctica, dar tratamiento con epinefrina.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Desconocidas.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No son diferentes a la dosis única, en caso de presentarse dé tratamiento con epinefrina.

Incompatibilidades:

No se reconocen incompatibilidades.

No se recomienda mezclar con otros productos veterinarios.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

PERIODO DE RETIRO:

No se administre 21 días antes del sacrificio de los animales.

PRESENTACIONES:

Frascos con 100 ml (50 dosis).

Frascos con 500 ml (250 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La Otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.