



## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® FELINE 2-FeLV

Reg. SAGARPA B-0273-270

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LA LEUCEMIA FELINA

##### FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus de inactivo de Leucemia Felina	> 1.0 UR*
Vehículo c.b.p.	1 dosis

\*Unidad de referencia medida por la prueba de ELISA para la proteína "gp70"

##### DESCRIPCIÓN:

**Nobivac® Feline 2-FeLV** contiene cultivos de tejido, derivados del virus de Leucemia Felina, subgrupos A y B. Los antígenos virales han sido químicamente inactivados y combinados con un adyuvante adecuado que ayuda a la respuesta inmune.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización de gatos sanos como auxiliar en la prevención de tumores linfoides y enfermedades asociadas con la infección causada por el virus de Leucemia Felina. La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus de Leucemia Felina.

##### ESPECIES DESTINO:

Felinos domésticos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

###### *Vacunación inicial:*

Aplicar una dosis de 1 ml por vía subcutánea o intramuscular, a partir de las 9 semanas de vida.

Repetir una dosis de 1ml 3 o 4 semanas después de la primera vacunación.

Para la inmunización primaria se recomienda la administración como mínimo de dos dosis de 1 ml.

###### *Revacunación:*

Revacunar cada dos años con una dosis única de Nobivac® Feline 2-FeLV. Los estudios indican que los gatos vacunados con Nobivac® Feline 2-FeLV están protegidos contra la viremia persistente FeLV durante al menos dos años después de la vacunación.

##### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- No puede alterar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas de diagnóstico de todos los gatos para el antígeno FeLV antes de la vacunación.
- Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.
- Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.



**CONTRAINDICACIONES:**

No vacunar durante la gestación y lactancia.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad, epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Algunos reportes sugieren que, en gatos, la administración de ciertos biológicos veterinarios puede inducir el desarrollo de fibrosarcomas en el sitio de inyección.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente animales sanos.

Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Gestación, lactancia y fertilidad:***

El producto no ha sido probado en hembras gestantes y en lactación, por lo que no se recomienda la vacunación durante el embarazo y lactancia.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

Ninguna conocida.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

***Incompatibilidades:***

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C, protegido de la luz.

No congelar.

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**PRESENTACIONES:**

Caja con 25 frascos de una dosis.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.



**INFORMACIÓN ADICIONAL:**  
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.  
**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:  
**Intervet Inc.**  
Omaha, Nebraska 68103  
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.